

عنوان مقاله:

تاثیر مشاوره بر اساس مدل مراقبت مستمر توسط ماما بر تهوع و استفراغ بارداری در مراجعه کنندگان به مراکز جامع سلامت شهر همدان، ۱۳۹۹

محل انتشار:

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، دوره 30، شماره 3 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

آزاده آزادی مقتدر - Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

سیده زهرا معصومی - Mother and Child Care Research Center, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

بتول خداکرمی - Mother and Child Care Research Center, Midwifery Department, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

قدرت الله روشنایی - Department of Biostatistics, School of public health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

پریسا پارسا - School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: تهوع و استفراغ دوران بارداری یکی از شکایات شایع زنان باردار است. مطالعه حاضر تاثیر مشاوره را بر اساس مدل مراقبت مستمر توسط ماما بر تهوع، استفراغ و اغ زدن در زنان باردار بررسی کرده است. مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو گروهی است که در سال ۱۳۹۹ روی ۶۰ خانم باردار در هفته ۸ تا ۱۲ بارداری انجام شد. برای شرکت کنندگان در گروه مداخله، سه جلسه مشاوره بر اساس مدل مراقبت مستمر توسط ماما به صورت چهره به چهره انجام شد. گروه کنترل مراقبت های روتین بارداری را دریافت کردند. شدت تهوع و استفراغ به تفکیک هریک از سوالات پرسش نامه PUQE، سه روز قبل از شروع مطالعه و هر روز، به مدت ۱۴ روز حین مطالعه بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ و آزمون های آماری کای اسکوئر و آزمون سنجش اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. P کمتر از ۰.۰۵ در نظر گرفته شد. یافته ها: در گروه مداخله بعد از انجام مشاوره توسط ماما، میانگین نمرات ساعات تهوع، دفعات استفراغ و اغ زدن و شدت کلی تهوع و استفراغ در طول دو هفته نسبت به قبل کاهش یافت ($P < 0.001$). اگرچه این کاهش نسبت به گروه کنترل در هفته اول مداخله معنی دار نبود ($P < 0.05$)، تفاوت بین دو گروه در هفته دوم مطالعه از نظر شدت کلی تهوع و استفراغ بر اساس نمره کلی پرسش نامه PUQE کاملاً معنی دار بود ($P < 0.05$). نتیجه گیری: استفاده از مدل مشاوره ای مراقبت مستمر توسط ماما برای کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری توصیه می شود.

کلمات کلیدی:

Hyperemesis Gravidarum, Long-term Care, Midwife, تهوع و استفراغ دوران بارداری، ماما، مراقبت مداوم

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1525646>

