

عنوان مقاله:

ارزیابی میزان آگاهی والدین درباره رویش دندان مولر اول دائمی و روش های پیشگیری از پوسیدگی دندان در مراجعین به مراکز بهداشتی شهر قم، سال ۱۳۹۶

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره ۱۲، شماره ۷ (سال: ۱۳۹۷)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۹

نویسندگان:

مصطفی صوفیانی قدیم - *Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Qom University of Medical Sciences*

سید علی اکبر کلانتر - *Faculty of Dentistry, Qom University of Medical Sciences*

آیدا مهدی پور - *Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Qom University of Medical Sciences*

حمید آسایش - *Department of Medical Emergency, Faculty of Paramedicine, Qom University of Medical Sciences*

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: دندان های مولر دائمی در سیستم دندانی از اهمیت زیادی برخوردارند و معمولا در سن ۶-۷ سالگی، بدون ایجاد عوارض خاصی رویش می یابند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی والدین درباره رویش دندان مولر اول دائمی و روش های پیشگیری از پوسیدگی دندان در مراجعین به مراکز بهداشتی شهر قم صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی ۲۵۹ نفر از والدین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قم، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه آگاهی درباره دندان مولر اول دائمی و روش های پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان جمع آوری شد. داده ها به کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون کای اسکور تحلیل شدند. یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان، $40/37 \pm 62/8$ سال و $6/60\%$ زن بودند. به ترتیب $4/27\%$ و 39% از والدین به سوال سن و محل رویش دندان مولر اول به درستی پاسخ دادند. 27% و $5/40\%$ از شرکت کنندگان نیز به ترتیب درباره روش فیشور سیلانت و فلوراید تراپی اطلاع داشتند. میزان آگاهی درباره سن و محل رویش دندان مولر اول، همچنین روش های پیشگیری از پوسیدگی با تحصیلات و شغل والدین، ارتباط معنی داری داشت. والدین دارای سابقه ویزیت دندانپزشکی کودک در سال اخیر، به میزان معنی داری دارای آگاهی بیشتری درباره سن و محل رویش دندان مولر اول، روش های فیشور سیلانت و فلورایدتراپی بودند. نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر، میزان آگاهی والدین درباره رویش دندان های دائمی مولر اول پایین بوده و آگاهی درباره روش فیشور سیلانت پایین و فلورایدتراپی در حد متوسط است؛ بنابراین طراحی برنامه های آموزشی مناسب برای بهبود وضعیت آگاهی والدین درباره زمان و محل رویش این دندان ها، همچنین روش های پیشگیری از پوسیدگی توصیه می گردد.

کلمات کلیدی:

Molar, Pit and fissure sealant, Fluoride therapy, Preventive Dentistry, Qom, Iran

مولر، فیشور سیلانت، فلورایدتراپی، دندانپزشکی پیشگیری، قم، ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1536183>



