

عنوان مقاله:

بررسی اپیدمیولوژیک سل خارج ریوی در استان قم، طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۴

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره ۱۱، شماره ۶ (سال: ۱۳۹۶)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسنده‌گان:

Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran – فاطمه رضایی

عابدین تقفی پور – Health center of Qom Province, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

نازین ضیا شیخ‌الاسلامی – Medicine faculty, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

محرم کرمی جوشین – Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: سل یک بیماری عفونی مهم است که معمولاً به دو شکل ریوی و خارج ریوی طبقه بندی می‌شود. امروزه، سل خارج ریوی تقریباً یک سوم موارد مبتلایان به سل را تشکیل می‌دهد. با توجه به روند صعودی بروز سل خارج ریوی در کشور، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک سل خارج ریوی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی مقطعی بر روی بیماران مبتلا به سل خارج ریوی، طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۴ در استان قم انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از بروندۀ های ۴۶۳ بیمار مبتلا به سل خارج ریوی به صورت سرشماری استخراج شد. داده‌ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: از کل موارد مسلول (۱۴۷۶ نفر)، نفر ۴۶۳ (۳۷٪/۳۱) مبتلا به سل خارج ریوی بودند. میزان بروز سل خارج ریوی از سال ۱۳۸۷-۱۳۹۴ به ترتیب ۳۸/۶، ۳۵/۵، ۳۵/۵، ۲۶/۴، ۲۶/۴، ۹/۵، ۹/۵، ۷۱/۴، ۷۱/۴، ۸/۵، ۸/۵ در ۱۰۰۰۰ نفر بود. میانگین سنی بیماران مبتلا به سل خارج ریوی ۴۳/۳۶ \pm ۴۷/۱۹ برابر شد. همچنین زنان بیشتر از مردان به سل خارج ریوی مبتلا شده و نسبت جنسی (مرد به زن) بیماران ۹/۰ بود. شایع ترین عضو درگیر سل خارج ریوی به ترتیب غدد لنفاوی (۳۰٪/۰۵)، پلور (۱۸٪/۰۵) و استخوان (۱۴٪/۰۷) گزارش شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بروز سل خارج ریوی در استان قم در سالهای اخیر، روند افزایشی داشته و سل غدد لنفاوی، شایع ترین نوع سل خارج ریوی در بین مبتلایان بوده است.

کلمات کلیدی:

سل خارج ریوی, Extra-pulmonary tuberculosis, Epidemiology, Qom, Iran

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1536335>