

عنوان مقاله:

شیوع بی دندانی کامل در بیماران سنین ۳۵ و بالای ۳۵ سال مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی منتخب شهر قم، سال ۱۳۹۳

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره ۱۰، شماره ۹ (سال: ۱۳۹۵)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۷

نویسندگان:

مینا حامیان - *Department of Oral & Maxillofacial Diseases, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran*

آریتا احسانی - *Faculty of Dentistry, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran*

مرضیه احسانی - *Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

سمیه مومنین - *Faculty of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

خلاصه مقاله:

زمینه وهدف: بی دندانی کامل، یک پدیده شایع در میان افراد مسن بوده که شیوع آن از شاخص های سلامت جامعه است. از دست دادن دندان ها منجر به بیماری های دستگاه گوارش، لطمه به زیبایی و کاهش توانایی های سایکولوژیک و اجتماعی افراد می شود. این پژوهش با هدف بررسی شیوع بی دندانی کامل در بیماران سنین ۳۵ و بالای ۳۵ سال، مراجعه کننده به کلینیک های منتخب دندانپزشکی شهر قم انجام شد. روش بررسی: دراین مطالعه مقطعی، تعداد ۳۹۴ نفر از بیماران (در سنین ۳۵ و بالای ۳۵ سال)، مراجعه کننده به کلینیک های منتخب دندانپزشکی شهر قم در سال ۱۳۹۳، به صورت تصادفی انتخاب شدند. قبل از انجام معاینات دهانی برای هر فرد در پرسشنامه ای مشخصات دموگرافیک شامل: سن، جنس، شغل، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، همچنین سابقه سیگارکشیدن، خشکی دهان، بیماری سیستمیک، رعایت بهداشت دهان و علل از دست رفتن دندان ها ثبت گردید. داده ها با استفاده ازآمار توصیفی و آزمون کای اسکور تحلیل شدند. سطح معنی داری، $p < 0.05$ در نظر گرفته شد. یافته ها: شیوع بی دندانی کامل در شهر قم، ۹/۲۳٪ بود که با جنسیت رابطه معنی داری داشت و در جنس مذکر بیشتر بود. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد میانگین سنی در افراد بی دندان کامل، بالاتر و برابر ۶/۵۶ می باشد. بیشترین علت از دست دادن دندان ها (۷۵٪) پوسیدگی بود. از بین افراد بی دندان کامل، ۸۴٪ تحصیلات زیردیپلم و ۶/۵۲٪ وضعیت اقتصادی متوسط داشتند. همچنین ۹/۷۱٪ از آنها به ندرت مسواک می زدند. نتیجه گیری: طبق نتایج، شیوع بی دندانی کامل در شهر قم بالا می باشد. همچنین بین شیوع بی دندانی کامل با سطح تحصیلات، کشیدن سیگار، پوسیدگی، بیماری های پریدونتال، وضعیت اقتصادی، شغل، خشکی دهان، رعایت بهداشت و بیماری های سیستمیک، رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

Edentulism, Etiology, Prevalence, Caries, Community dentistry

دندانی کامل، علت، شیوع، پوسیدگی، دندانپزشکی جامعه نگر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1536432>

