

عنوان مقاله:

بررسی شیوع سزارین بر حسب شاخص توده ی بدنی در زایشگاه مهدیه ی شهر بم، در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره 3، شماره 4 (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

لاله سلیمانی زاده - Kerman University of Medical Sciences

فرزانه سلیمانی زاده - Ministry of Health

مریم عسکری زاده ماهانی - Kerman University of Medical Sciences

نیلوفر ظفرنیا - Yazd University of Medical Sciences

مصطفی جوادى

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: وزن غیرطبیعی مادر می تواند در بهداشت باروری موثر باشد. برخی از شاخص های توده ی بدنی مادر نیز نقش مهمی در بروز عوارض بارداری و تولد نوزاد با وزن بالا و افزایش میزان سزارین دارند. بنابراین عوارضی از قبیل عفونت شدید، خونریزی، حملات ترومبوآمبولی و پنومونی استنشاقی در زنان حامله ای که سزارین می شوند، بیشتر است. هدف از مراقبت های قبل از زایمان، تولد نوزاد سالم می باشد، هم چنین وزن طبیعی مادر از شرایط بهداشت دوران بارداری محسوب می گردد. لذا این بررسی به منظور تعیین شیوع سزارین بر حسب شاخص توده ی بدنی مادر در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه مهدیه ی شهر بم، در سال ۱۳۸۴ انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه، به صورت توصیفی- مقطعی بر روی ۲۹۴ زن حامله در سه گروه؛ کم وزن ($n=111$)، وزن طبیعی ($n=145$) و سنگین وزن ($n=38$) انجام گردید. تمامی زنان خواستار زایمان طبیعی بودند و هیچ کدام بدون اندیکاسیون تحت عمل سزارین قرار نگرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای که در سه بخش تنظیم شده بود، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی و آزمون مجذور کای و آنالیز واریانس به کار برده شد، و $P > 0.05$ تفاوت معنی دار تلقی گردید. یافته ها: در این بررسی میزان سزارین در زنان چاق ۹/۲۸٪، زنان با وزن طبیعی ۲/۱۵٪ و کم وزن ۵/۴٪ بوده است که تفاوت معنی داری را بین این سه گروه نشان می داد. گروه سنگین وزن بیشترین میانگین سن مادر را در مقایسه با گروه کم وزن و طبیعی داشتند. میانگین وزن نوزادان در گروه سنگین وزن به طور معنی داری بیش از گروه زنان با وزن طبیعی و کم وزن بود، ولی میانگین نمرات آپگار دقایق اول و پنجم در این گروه کمتر گزارش گردید. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق، توصیه می گردد زنان چاق قبل از حاملگی، برای رسیدن به وزن مناسب مورد مشاوره قرار گیرند، و در دوران بارداری نیز در زمینه ی یک رژیم غذایی مناسب و سطح فعالیت لازم مشاوره شوند؛ تا بتوان با یک برنامه ریزی صحیح و آموزش کافی دوران بارداری به زنان، نتایج حاملگی موفق را حاصل نمود.

کلمات کلیدی:

Obesity, Cesarean Section, Pregnancy Outcome, Body Mass Index, Bam, Iran

چاقی؛ سزارین؛ نتایج حاملگی؛ شاخص توده ی بدنی؛ بم، ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1543082>



