

عنوان مقاله:

هایفمای متعاقب ترومای چشمی

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره 5، شماره 5 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

ابراهیم میکائیلی - Babol University of Medical Sciences

سید احمد رسولی نژاد - Babol University of Medical Sciences

محمد میکائیلی - Babol University of Medical Sciences

امیرحسین شیرزادیان - Babol University of Medical Sciences

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: هایفما به وجود خون در اتاق قدامی چشم اطلاق می شود که می تواند به علت ترومای نافذ یا غیرنافذ و یا مسائل دیگر ایجاد گردد. این مطالعه با هدف بررسی هایفمای متعاقب ترومای چشمی در مراجعین به مرکز آموزشی- درمانی چشم بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه سری مورد، خصوصیات بالینی ۱۵ بیمار دچار ترومای چشمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی چشم بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۷، بررسی گردید. بیماران انتخاب شده علاوه بر ترومای چشمی دچار خونریزی میکروسکوپی یا ماکروسکوپی اتاق قدامی چشم نیز بودند. یافته ها: متوسط سنی بیماران ۱/۲۵ سال بود. ۱۱ بیمار مرد و ۴ بیمار زن بودند. افزایش فشار داخل چشمی در ۴ مورد مشاهده گردید که با درمان دارویی ۳ مورد بهبود یافتند، ولی یک مورد به علت افزایش فشار داخل چشمی و خونریزی مجدد، تحت عمل جراحی قرار گرفت. از نظر درجه هایفما، ۴ مورد هایفمای میکروسکوپی، ۲ مورد هایفمای درجه یک، ۳ مورد هایفمای درجه ۲، ۳ مورد هایفمای درجه ۳، ۲ مورد هایفمای درجه ۴ و یک مورد هم به علت مسطح شدن محوطه اتاق قدامی، قابل بررسی نبود. در بدو پذیرش، در اکثریت وضعیت بینایی ضعیف بود که پس از درمان، بهبود قابل ملاحظه ای یافتند. مجموعاً در ۶ بیمار عمل جراحی صورت گرفت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد در بدو پذیرش معمولاً بیماران با هایفمای تروماتیک، بینایی نسبتاً ضعیفی دارند، ولی در بسیاری موارد با درمان به موقع، میزان بینایی آنها بهبود می یابد. لذا درمان صحیح و به موقع این بیماران الزامی و ضروری است.

کلمات کلیدی:

HypHEMA, Wounds and Injuries, Vision, Ocular, هایفما؛ زخم و آسیب چشمی؛ بینایی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1543345>

