

عنوان مقاله:

ارزیابی نقش داروساز بالینی در بهینه سازی روند پیشگیری از آسیب مخاطی گوارشی ناشی از استرس در بیماران بستری در بخش نفرولوژی: یک مطالعه نیمه تجربی

محل انتشار:

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 19، شماره 3 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسنده‌گان:

Kerman University of Medical Sciences - ناعمه نیک وز -

زهرا سیدی - Kerman University of Medical Sciences

خلاصه مقاله:

چکیده زمینه و هدف: تجویز داروهای کاهنده اسید معده برای پیشگیری از آسیب مخاطی گوارشی ناشی از استرس در بیماران بستری در موارد زیادی نامناسب است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش داروساز بالینی در بهبود تجویز این داروها طراحی شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی ۱۰۱ بیمار بستری در بخش نفرولوژی بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. بیمارانی که بیش تر از ۲۴ ساعت بستری باقی ماندند، وارد مطالعه شدند. در مرحله قبل از مداخله، هر بیمار از نظر خطر ابتلاء به آسیب مخاطی گوارشی و دریافت یا عدم دریافت دارو برای پیشگیری از آسیب مخاطی بررسی شد. در مرحله دوم، داروساز بالینی فعالانه مداخله کرد و برای بیمارانی که در خطر پایین آسیب گوارشی بودند، توصیه به قطع دارو کرد. برای بیمارانی که در خطر بالا آسیب گوارشی بودند اما داروی کاهنده اسید معده نمی‌گرفتند، توصیه به آغاز دارو کرد. تعداد بیمارانی که در هر مرحله به صورت مناسب داروی پیشگیری دریافت می‌کردند، گزارش شد. داده‌ها با آزمون مجدول کای تحلیل شدند. یافته‌ها: ۵۷ بیمار در مرحله قبل از مداخله و ۴۴ بیمار در مرحله مداخله ارزیابی شدند. تعداد بیمارانی که به صورت نامناسب پیشگیری دریافت می‌کردند، از ۳۷ نفر (درصد) در مرحله قبل از مداخله به ۶ نفر (۱۶/درصد) در مرحله بعد از مداخله کاهش یافت ($P < 0.001$). نتیجه گیری: با توجه به نقش موثر داروساز بالینی در این مطالعه، پیشنهاد می‌گردد از مشاوره داروساز بالینی برای بهبود تجویز منطقی دارو در پیشگیری از آسیب مخاط گوارشی در بیماران بستری استفاده شود. واژه‌های کلیدی: داروساز بالینی، آسیب مخاطی گوارشی، استرس، پیشگیری، نفرولوژی

کلمات کلیدی:

Clinical pharmacist, Mucosal disease, Stress, Prevention, Nephrology
پیشگیری، نفرولوژی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1586430>

