

عنوان مقاله:

بررسی مقایسه ای سن دریافت خدمات درمانی مختلف در بیماران مراجعه کننده به تیم شکاف کام اصفهان

محل انتشار:

مجله پژوهش در علوم توانبخشی، دوره 7، شماره 3 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

فاطمه درخشنده - PhD Student in Speech Therapy, Students Research Committee, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

هدیه هاشمی - MSc Student in Speech and Language Pathology, Students Research Committee, Cleft Lip and Palate Research Center, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

مهرداد معمارزاده - Associate Professor, Pediatric Surgery, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: به علت مشکلات متعدد بیماران مبتلا به انواع شکاف کام و لب، مدیریت درمانی آن ها کار تیمی و میان رشته ای را می طلبد. مطالعه حاضر با هدف، بررسی مقایسه ای سن شروع گفتار درمانی، جراحی ثانویه کام، پیوند استخوان آلوئول و ارتودنسی در دو گروه مراجعان زود هنگام و مراجعان دیر هنگام به تیم شکاف کام صورت پذیرفت. روش ها: در این بررسی ۲۶۰ پرونده از بیماران مبتلا به انواع شکاف های کام و لب بر اساس سن ورود به تیم شکاف کام به دو گروه مراجعان زود هنگام و مراجعان دیر هنگام تقسیم شدند و از نظر چهار متغیر میانگین سن شروع گفتار درمانی، میانگین سن جراحی های ثانویه و جراحی آلوئول و سن شروع خدمات ارتودنسی از طریق آزمون T-Test مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، از میان ۱۳۴ نفری که به گفتار درمانی مراجعه کرده بودند، میانگین سن شروع گفتار درمانی در مراجعه کنندگان زود هنگام ۳/۳ سال و در گروه مراجعه کنندگان دیر هنگام ۹ سال، از مجموع ۴۷ نفری که جراحی ثانویه داشته اند، میانگین سن انجام جراحی در مراجعین زود هنگام ۸۸/۳ و در گروه دوم ۷/۱۵ سال، از مجموع ۱۷ نفری که جراحی پیوند استخوان آلوئول داشته اند، میانگین سن انجام جراحی در گروه اول ۹ سال و در گروه دوم ۶۹/۱۶ سال و از ۲۴ نفری که خدمات ارتودنسی دریافت کرده اند، میانگین سن شروع ارتودنسی در مراجعین زود هنگام ۶۶/۷ و در گروه دیگر ۵/۱۷ سال می باشد. نتیجه گیری: یافته های به دست آمده حاکی از آن است که سن انجام جراحی های ثانویه و آلوئول و سن شروع خدمات گفتار درمانی و ارتودنسی در مبتلایان به شکاف لب و کام در دو گروه مراجعه کنندگان زود هنگام و دیر هنگام به تیم، تفاوت معنی داری دارند. کلید واژه ها: شکاف کام، جراحی ثانویه، گفتار درمانی، مداخله زود هنگام

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1593418>

