

عنوان مقاله:

نابرابری در دریافت آزمون های غربالگری سرطان پستان در میان زنان غرب ایران

محل انتشار:

فصلنامه بیماری های پستان، دوره 15، شماره 4 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسندگان:

مهدی میرزایی علویجه - Kermanshah University of Medical Sciences

مهین امینی - Kermanshah University of Medical Sciences

ابوذر کشاورزی - Kermanshah University of Medical Sciences

فرزاد جلیلیان - Kermanshah University of Medical Sciences

خلاصه مقاله:

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان ایرانی می باشد. مطالعات فراوانی تاثیر مثبت انجام رفتارهای غربالگری در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را نشان دادند. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان نابرابری در دریافت آزمون های غربالگری سرطان پستان (خودآزمایی، معاینه بالینی و ماموگرافی) در غرب ایران بود. روش بررسی: این پژوهش مقطعی در میان ۹۰۷ نفر از زنان بالای ۳۰ سال در شهر کرمانشاه انجام شد. اطلاعات بوسیله پرسشنامه با انجام مصاحبه جمع آوری گردید. شاخص و منحنی تمرکز برای تعیین کمیت و تجزیه نابرابری در انجام غربالگری سرطان پستان (خودآزمایی، معاینه بالینی و ماموگرافی) استفاده شد. برای نشان دادن رابطه هر کدام از سه رفتار غربالگری با زیر گروه های مختلف از نسبت شانس خام و نسبت شانس تطبیق داده شده استفاده شد. یافته ها: سابقه انجام خودآزمایی، معاینه بالینی و ماموگرافی به ترتیب ۲۲/۲۸ درصد، ۸۵/۱۸ درصد و ۷۵/۱۷ درصد بود. منحنی تمرکز (Cn) برای خودآزمایی ۲۶۸/۰ + (P < ۰۰۱/۰)، معاینه بالینی ۱۲۶/۰ + (P < ۰۰۱/۰) و ماموگرافی ۰۶۶/۰ (P = ۱۶۶/۰) به دست آمد. نتیجه گیری: تمرکز مداخلات ارتقاء سلامت باید گروه های با وضعیت اقتصادی-جامعه ای پایین را هدف قرار دهد. توسعه کمپین های ارتقاء دانش عمومی بخصوص برای زنان کمتر تحصیل کرده می تواند یافته های سودمندی را در کاهش نابرابری در انجام رفتارهای های دریافت آزمون های غربالگری سرطان پستان به دنبال داشته باشد.

کلمات کلیدی:

Inequality, Breast Cancer, Screening, Iran, نابرابری، سرطان پستان، غربالگری، ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1594990>

