

## عنوان مقاله:

ادراک درد، تاب آوری، تحمل ناکامی و پرخاشگری زنان و مردان تحت درمان با متادون در شهر تهران

## محل انتشار:

فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی، دوره 11، شماره 1 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

## نویسندگان:

لیلا ذوقی - Department of Psychology, Faculty of Human Resources, Amin University of Police, Tehran, Iran

بینا آجیل چی - Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran

مرضیه غلامعلی - Department of General Psychology, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran

## خلاصه مقاله:

اهداف: شواهد پژوهش بیانگر تفاوت های فیزیولوژیکی و روان شناختی در زنان و مردان مبتلا به سوء مصرف مواد است. در پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت های جنسیتی در درمان سوء مصرف مواد مخدر در بعد روان شناختی به مقایسه ادراک درد، تاب آوری، تحمل ناکامی و پرخاشگری زنان و مردان تحت درمان با برنامه نگهدارنده با متادون پرداخته شد. مواد و روش ها: بدین منظور ۳۰۰ نفر (۱۵۰ مرد و ۱۵۰ زن) با دامنه سنی ۱۷ تا ۳۶ سال و تحصیلات دیپلم و بالاتر در یک پژوهش توصیفی با روش علی-مقایسه ای از بین افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۸ که تحت درمان با برنامه نگهدارنده متادون بودند، به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به پرسش نامه های ادراک درد (پایایی ۰/۸۷)، تاب آوری (پایایی ۰/۸۴)، تحمل ناکامی (پایایی ۰/۷۲) و پرخاشگری (پایایی ۰/۷۱) پاسخ دادند. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تی همبسته توسط نرم افزار SPSS ۲۴ تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بیش ترین فراوانی مربوط به افراد بین ۲۲ تا ۲۶ سال، مدرک کارشناسی و سابقه کاری ۱۱ تا ۱۵ سال بود. میانگین شاخص های مورد بررسی به ترتیب در زنان و مردان برای ادراک درد  $4/125 \pm 0/521$  و  $3/258 \pm 0/359$ ، برای تاب آوری  $3/961 \pm 0/357$  و  $3/651 \pm 0/198$ ، برای تحمل ناکامی  $4/208 \pm 0/137$  و  $3/247 \pm 0/137$  و برای پرخاشگری  $3/621 \pm 0/211$  و  $4/188 \pm 0/652$  بود. تفاوت بین ادراک درد، تحمل ناکامی و پرخاشگری در زنان و مردان در سطح  $p > 0/05$  معنادار بود اما تفاوت معناداری بین تاب آوری زنان و مردان مشاهده نشد. نتیجه گیری: زنان در فرآیند ترک مواد مخدر با متادون ادراک درد بیشتر و تحمل ناکامی کمتری نسبت به مردان دارند ولی مردان پرخاشگری بیشتری نسبت به زنان نشان می دهند. به نظر می رسد فرآیند ترک با متادون برای زنان سخت تر از مردان است. تاب آوری مردان و زنان در این برنامه درمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند.

## کلمات کلیدی:

Pain Perception, Failure tolerance, Aggression, Methadone, ادراک درد، ناکامی، پرخاشگری، متادون

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1602610>

