

عنوان مقاله:

بررسی فراوانی روزهای مهآلود در استان هرمزگان

محل انتشار:

دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

رحمان زندی - دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

عابد گل کرمی - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

رخداد جوی مه تاثیر بسیار زیادی در فعالیتهای بشر امروزی دارد و از دو جنبهی فایده و زیان میتوان به آن نگاه کرد که پیشبینی آن بهخاطر شناخت ناکافی از علل بروز آن بسیار مشکل است. از اینرو در این مقاله به بررسی فراوانی روزهای مهآلود و مقایسه ایستگاههای ساحلی و جزیره‌ای و همچنین نقش عوامل جغرافیایی در پراکنش زمانی و مکانی رخداد این پدیده اقلیمی در استان هرمزگان بهعنوان یکی از نقاط مهخیز کشور پرداخته شده است. بدین منظور دادههای آماری 7 ایستگاه سینوپتیک در یک دوره ده ساله (1996-2005) انتخاب شده است به گونهای که ابتدا میانگین ماهانه، فصلی و دورههای گرم و سرد سال بررسی گردیده است. نتایج بررسیها نشان میدهد، بیشترین فراوانی در موقعیت ساحلی مرداد ماه، فصل تابستان و دوره گرم سال در ایستگاه جاسک و سالیانه ایستگاه بندرعباس و کمترین فراوانی در اردیبهشت ماه، فصل بهار و دوره سرد سال در ایستگاه میناب است. در موقعیت جزیره‌ای بیشترین فراوانی مرداد ماه، فصل تابستان و دوره گرم و سالیانه در ایستگاه جزیره کیش است و کمترین فراوانی در جزیره سیری رخ میدهد

کلمات کلیدی:

روزهای مهآلود، پراکنش زمانی، پراکنش مکانی، استان هرمزگان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/160962>

