

عنوان مقاله:

مروری بر رده بندی و پراکنش گکوی انگشت برگی جنس *Asaccus* (سوسماران: Phyllodactylidae) در خاور میانه

محل انتشار:

مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران، دوره 2، شماره 1 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 18

نویسندگان:

اکبر فتاحی - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

نصراله رستگارپویانی - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

اسکندر رستگار پویانی - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

رسول کریمیانی - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

خلاصه مقاله:

در این تحقیق مروری بر جنس *Asaccus* درخاورمیانه (Dixon & Anderson, ۱۹۷۳) انجام گرفت. گکوی انگشت برگی جنس *Asaccus* که یک گروه vicariance است در جنوب آناتولی، شرق عراق، غرب و جنوب غربی ایران، سوریه، شمال عمان و امارات متحده عربی پراکنش دارد. این جنس متعلق به خانواده Phyllodactylidae است، که شامل ۱۰ جنس، ۱۵۸ گونه و ۴۶ زیرگونه می باشد. جنس *Asaccus* به دو دودمان (clade) جغرافیایی مجزا تقسیم شده است، دودمان اول بومی منطقه بین النهرین (غرب ایران، شرق عراق، ترکیه و سوریه) که شامل: *A. andersoni*, *A. elisae*, *A. granularis*, *A. griseonotus*, *A. iranicus*, *A. kermanshahensis*, *A. kurdistanensis*, *A. nasrullahi*, *A. tangestanensis*, *A. zagrosicus*, *A. saffinae*

و *A. barani* می باشند که همگی محدود به رشته کوه های زاگرس و مناطق مجاور آن هستند. دودمان دوم که در کوه های شمال عمان و برخی مناطق امارات متحده عربی پراکنش دارند و شامل: *A. arnoldi*, *A. caudivolvulus*, *A. gallagheri*, *A. gardneri*, *A. platyrhynchus*, *A. margaritae* و *A. montanus* می باشند. حوادث تاریخی و جغرافیایی در خاورمیانه اثرات مهمی بر پراکنش و تکامل این جنس داشته است.

کلمات کلیدی:

گکوی انگشت برگی، رده بندی، پراکنش، ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1615041>

