

عنوان مقاله:

بررسی فراوانی عوارض شایع دیابت در زنان باردار مبتلای مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد

محل انتشار:

کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسنده:

مهرداد امرایی - کارشناس ارشد زیست شناسی جانوری گرایش سلولی تکوینی، دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه

خلاصه مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فراوانی ضایعات پوستی در زنان مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد انجام شد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی، از نوع توصیفی - مقطعی بوده که مبتنی بر روش گردآوری میدانی است. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به دیابت بارداری در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال شهر خرم آباد بود که به روش تصادفی و با رضایت بیمار ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات سابقه بیمار در بیمارستان مذکور بود. یافته های پژوهش نشان داد ۳۵٪ نمونه در سنین ۳۱ تا ۳۵ سال بوده اند که اکثریت نمونه را دارند ۴۵٪ دارای سابقه دیابت بوده اند. همچنین از نظر شیوع عوارض پوستی ۲۵/۸٪ دارای خارش مزمن پوستی، ۲۳/۳٪ دارای ریزش مو، ۸/۳٪ دارای زخم پوستی، ۴/۳٪ دارای خارش ژنیتال، ۲/۵٪ دارای عارضه ویتیلگو، ۵٪ دارای عارضه کاندیدیازیس و ۸/۸٪ دارای زخم وریدی بوده اند. از نظر شیوع عوارض پوستی در نوزادان ۱۶/۷٪ دارای زخم پوستی ۱۲/۵٪ دارای زخم پوستی، ۳/۳٪ دارای خارش ژنیتال، ۲/۵٪ دارای عارضه ویتیلگو و ۳/۸٪ دارای عارضه کاندیدیازیس از نظر شیوع عوارض غیرپوستی بیماری مادران ۳۱/۷٪ دارای عوارض عصبی (نوروپاتی)، ۲۰٪ دارای عوارض کلیوی (نفروپاتی)، ۱۹/۲٪ دارای عوارض چشمی (رتینوپاتی)، ۱۴/۲٪ دارای عوارض قلبی - عروقی و ۱۱/۷٪ دارای مشکل پای دیابتی بوده اند. از نظر شیوع عوارض نوزادی ۱۷/۵٪ در بخش NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) بستری شده اند، ۱۵٪ دارای ناهنجاری های مادرزادی، ۱۴/۲٪ دارای عوارض ماکروزومی، ۱۰٪ دارای هیپوگلیسمی ساعت اول و ۵٪ هیپوگلیسمی، ۸/۸٪ اریتروسیتوز و ۲/۵٪ ایکتر داشته اند.

کلمات کلیدی:

ضایعات پوستی، دیابت بارداری، خرم آباد، عوارض

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1624008>

