

عنوان مقاله:

مرگ مادر باردار ناشی از آمبولی ریه: گزارش مورد

محل انتشار:

دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

مریم سادات کاتبی - کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قاین، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

علی عرب احمدی - کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قاین، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

محمد هادی سروری - کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قاین، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خلاصه مقاله:

مقدمه: شاخص مرگ و میر مادران یکی از شاخصهای مهم بهداشتی است که امروزه با وجود پیشرفتهای فراوان در حوزه بهداشت و درمان، به دلایل زیادی همچنان بالاتر از حد انتظار است که در این میان ترومبوآمبولی وریدی حدود ۱۰ درصد از این مرگها را تشکیل میدهد. معرفی مورد: خانم ۴۵ ساله با سن حاملگی ۳۸ هفته و ۶ روز برای سزارین انتخابی در بیمارستان بستری شد و مدتی پس از ورود با تنگی نفس شدید، سیانوز لب و خونی و خونی ترشحات کف آلود از دهان، او تحت نظارت قلبی و اکسیژن درمانی با اکوکاردیوگرافی فراکشنال قرار گرفت. جهش/کسری ۳۰٪ و وجود رال در سمع صداهای ریوی تایید شد. با اعلام کد ۹۹، همزمان با انجام سزارین اورژانسی در شرایط کاملاً غیر استریل، لوله گذاری و احیای قلبی عروقی انجام شد. در طی مراحل احیا، نوزاد به بخش مراقبت های تهاجمی منتقل شد و سپس به بیمارستان سطح سوم اعزام شد. مادر هم دچار آسیبستول شد و نمود پزشکی قانونی علت مرگ را آمبولی ریه اعلام کرد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه آمبولی ریه یکی از اورژانسهای شایع غیرمامایی در بارداری است و تشخیص و تایید آن در بارداری بسیار دشوار و چالش برانگیز است، بنابراین وجود معیارهایی مانند معیار ولز بر اساس شاخصهای بالینی و شرایط مستعد و عامل خطر وجود دارد که می توانند در تشخیص نهایی و جلوگیری از مرگ مادر نقش موثری داشته باشند.

کلمات کلیدی:

آمبولی ریه، بارداری، مرگ و میر مادران.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1624223>

