

عنوان مقاله:

اثر بخشی وایمنی الکتروشوک درمانی در اختلالات کاتاتونی هیپرکینتیک سیکلوتایمی و هیپومانیا

محل انتشار:

سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسنده:

زهرا ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

کاتاتونی هیپرکینتیک یک سندرم عصبی روانپزشکی است که هم بر رفتار و هم بر عملکرد حرکتی تاثیر می گذارد و به طور بالقوه منجر به عدم پاسخگویی در فردی می شود که در غیر این صورت به نظر می رسد بیدار است. کاتاتونیا می تواند در زمینه چندین وضعیت روانی یا پزشکی زمینه ای رخ دهد. الکتروشوک درمانی (ECT) یک درمان مبتنی برای کاتاتونی است و اثر بخشی آن از اوایل دهه ۱۹۳۰ نشان داده شده است. الکتروشوک درمانی (ECT) نه تنها برای تسکین کاتاتونی هیپرکینتیک بلکه برخی از آسیب شناسی روانی زمینه ای از جمله اختلالات خلقی سیکلوتایمی و هیپومانیا ثابت شده است. روش مرسوم ECT که برای درمان کاتاتونیا استفاده شده است، قرار دادن سرب دو طرفه (BL) با عرض پالس کوتاه (< ۰.۵ میلی ثانیه) است. کاتاتونیا تقریباً همیشه ثانویه به یک بیماری زمینه ای دیگر است که اغلب یک اختلال روانپزشکی است. اختلالات خلقی مانند اختلال دوقطبی و افسردگی شایع ترین علل پیشرفت به سمت کاتاتونی هستند. سایر اختلالات روان پریشی اولیه است. همچنین با اختلالات طیف اوتیسم مرتبط است یکی از ویژگی های روش درمان ECT سریع بودن نسبی پاسخ آن است و این موضوع در بیمارانی که رفتار مانیک آن ها سطوح خطرناکی از اتلاف قوا برایشان ایجاد کرده مفید است. درمان تشنج الکتریکی به عنوان درمان خط دوم پس از آزمایشات بنزودیازپین با دوز بالا استفاده می شود. الکتروشوک درمانی یک روش موثر، ایمن و مفید در درمان جوانان کاتاتونیک و سیکلوتایمی و هیپومانیا است.

کلمات کلیدی:

اختلال کاتاتونی هیپرکینتیک، الکتروشوک درمانی، سیکلوتایمی، هیپومانیا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1630342>

