

عنوان مقاله:

بررسی الگوی مکانی درختچه ها در بیشه پارک ملی گلستان

محل انتشار:

مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 18، شماره 4 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

نغمه غلامی - دانشجوی دکتری مرتع داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

منصور مصداقی - استاد، گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:

در این مطالعه الگوی مکانی درختچه‌ها بر روی نوع الگو در دو قسمت تخریبی و حفاظتی پارک ملی گلستان توسط روش فاصله‌ای مربع T بررسی شد. طبق نتایج بدست آمده در تپ بیشه، درختچه‌ها به صورت کپه‌ای-یکنواخت و کپه‌ای-تصادفی هستند. در قسمت حفاظتی به دلیل عدم چرای دام، گونه‌های متعددی از درختچه‌ها ظاهر شده و پوشش گیاهی (گندمیان و پهن برگان علفی) زیراشکوب درختچه‌ها، سطح بیشتری از خاک منطقه را پوشش داده و غنا و تنوع بیشتری به الگوی حاکم بر منطقه داده است. در حالی که در قسمت تخریبی، گونه غالب *Ephedra distachya* می‌باشد. از این رو، گندمیان و پهن برگان علفی سهم کمتری را در منطقه به خود اختصاص داده‌اند؛ و خاک لخت و سنگریزه‌ها نمایان شده‌اند. در نتیجه منطقه از غنا و تنوع کمتری برخوردار می‌باشد.

کلمات کلیدی:

غنا، تنوع گونه ای، الگوی مکانی، فاصله مربع T، کپه ای-تصادفی، کپه ای-یکنواخت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1632830>

