

عنوان مقاله:

اثر بخشی پساری در جلوگیری از زایمان زودرس در افراد با سرویکس کوتاه: مرور سیستماتیک

محل انتشار:

نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 2

نویسنده:

پیمان شکراللهی - دانشکده علوم پزشکی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

خلاصه مقاله:

هدف: زایمان زودرس دارای عوامل خطر متعددی از جمله ناتوانی سرویکس است. برای پیشگیری از زایمان زودرس روش های متعددی پیشنهاد شده است از قبیل تجویز پروژسترون واژینال، سرکلاژ و یا توصیه به کارگذاری پساری. پساری دهانه رحم به عنوان یک جایگزین ساده و غیر تهاجمی مورد توجه م یباید. به همین جهت این مطالعه برای تعیین اثر بخشی پساری در جلوگیری از زایمان زودرس در افراد با سرویکس کوتاه انجام شد. روش کار: این مطالعه بصورت روش مرور سیستماتیک با جستجو در دو پایگاه داده های گوگل اسکولار و پاب مد صورت گرفت. مطالعات بعد از سال ۲۰۱۶ با کلید واژه های cervical length، (preterm birth or preterm labor or preterm delivery)، pessary، RCT، مورد جستجو قرار گرفت. شرایط ورود به مطالعه شامل مقالاتی بود که در آن ن کارآزمایی بالینی با مداخله کارگذاری پساری در افراد با سرویکس کوتاه یا بدون سابقه زایمان زودرس صورت گرفته باشد. نهایتاً ۱۲ مطالعه در جدول ماتریکس مورد مرور قرار گرفت. یافته ها: مرور مطالعات نشان دهنده هتروژنیتی در بین آنان بود. انتخاب مادران با حاملگی یک قلو یا دوقلو، تفاوت در ملاک انتخاب کوتاه ترین طول سرویکس؛ همراهی مداخله پساری با تجویز پروژسترون واژینال یا به تنهایی و همچنین تفاوت در انتخاب پیامدهای بارداری برای سنجش تاثی رگذاری پساری از قبیل زایمان زودرس قبل از هفته ۳۷ یا ۳۴ از موارد هتروژنیتی مطالعات بود؛ که مقایسه آنان را مشکل می کرد. یافته های ۶ مطالعات نشان دهنده وجود تاثیر پساری بصورت کاهش در زایمان زودرس قبل از هفته ۳۴ یا ۳۷ حاملگی چه در بارداری های منفرد و چه دوقلوی (چه به تنهایی چه همراه با تجویز پروژسترون) نسبت به گروه های کنترلی بود، که درمان انتظاری یا پروژسترون واژینال می گرفتند. در شش مطالعه دیگر اگر چه کاهش در خطر نسبی تعدیل شده در جلوگیری از زایمان زودرس در گروه های پساری بدست آمده بود، ولی آزمون های آماری معنی دار نبودند. نتیجه: در برخی مطالعات اثر بخشی پساری در کاهش زایمان زودرس معنی دار بود و در هیچکدام از مطالعات کارگذاری پساری اثربخشی کمتر از مراقبت های روتین و تجویز پروژسترون نداشت.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1651421>

