

عنوان مقاله:

ارتباط بین عزت نفس با حمایت اجتماعی درک شده در بیماران دارای استومی

محل انتشار:

نشریه پرستاری ایران، دوره 33، شماره 127 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

سیده ماهرخ علی نقی مداح - *Department of Anesthesiology, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

فیروز خالدی سردشتی - *Department of Nursing, Borujen Faculty of Nursing, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran*

جعفر مقدسی - *Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran*

نرگس ناصری بروجنی - *Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

سمانه دهقان ابنوی - *Department of Operating Room, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran*

فرهاد دادگر - *Department of Medicine, Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran*

حمید رضا صادقی گندمانی - *Department of Nursing, Borujen Faculty of Nursing, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran (Corresponding author) Tel: ۹۸۳۸۳۴۲۴۵۷۷۷ Email: sadeghi.h@skums.ac.ir*

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال نوعی بیماری پیشرونده دستگاه گوارش است که منجر به تعبیه استومی برای بیماران می شود. از طرفی تظاهرات و عوارض ناشی از تعبیه استومی موجب ایجاد مشکلات جسمی و روانی متعددی برای بیمار می شود. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط عزت نفس با حمایت اجتماعی درک شده در بیماران دارای استومی انجام شد. روش بررسی: این یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی توصیفی است. نمونه مطالعه شامل ۳۵۰ بیمار دارای استومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران در شهر تهران بود. جهت نمونه گیری از روش در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه عزت نفس Rosenberg و حمایت اجتماعی Northouse بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون های آماری t مستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: میانگین و انحراف معیار عزت نفس و حمایت اجتماعی درک شده بیماران به ترتیب $17/5 \pm 56/20$ (از نمره کل ۳۰) و $47/15 \pm 17/131$ (از نمره کل ۲۰۰) بود. بر اساس یافته های این مطالعه، میانگین نمره عزت نفس و حمایت اجتماعی درک شده در بیماران دارای استومی در سطح متوسط قرار داشت. بین نمره= حمایت اجتماعی درک شده با عزت نفس رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت ($p=0/02$ و $p=0/001$). نتیجه گیری کلی: از آن جایی که حمایت اجتماعی درک شده بر عزت نفس نقش به سزایی دارد، توصیه می شود که پرستاران با شناسایی گروه های پرخطر از نظر دریافت و درک حمایت اجتماعی، پیوسته نیازهای حمایتی بیماران را بررسی کرده و با ارتقاء سطح بهداشت روانی و پیوند دادن بیماران با اجتماع، خانواده ها و گروه های دوستان به این بعد روان شناختی توجه شایسته نمایند

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1667179>

