

عنوان مقاله:

مقایسه ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA

محل انتشار:

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره، دوره 4، شماره 4 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 18

نویسندگان:

علیرضا چهره سا - دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

مهریار عناصری - دکتری تخصصی روان شناسی، گروه روان شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

محمد حاتمی - دکتری تخصصی روان شناسی، گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM) با درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر افکار خودآیند، انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA بود. روش پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه می باشد که نمونه، شامل دو گروه مداخله و یک گروه گواه (هر گروه ۱۵ نفر) از کلیه ی بیماران داوطلب (تمایلی) و طرح جمع آوری معنادان متجاهر (غربالگری بهزیستی) پذیرش شده در موسسه ی بهبودی اقامتی میان مدت (Camp) امید ایمان رهایی -مرکز ماده ۱۵- واقع در شهر ماهدشت استان البرز بود که به روش غیرتصادفی هدفمند گزینش و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (E1-E2) و گروه گواه جای گرفتند. از مدل های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس تک متغیره (ANCOVA) جهت آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته و در نهایت مشخص گردید که بین افکار خودآیند، انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در الگوی درمانی فرانظری (TTM) و الگوی درمانی کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) در بیماران مرد دارای اختلال مصرف Pethidine و MDMA، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

درمان مبتنی بر الگوی فرانظری (TTM)، درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT)، افکار خودآیند، انعطاف پذیری شناختی، تمایزیافتگی خود، بیماران دارای اختلال مصرف ماده ی Pethidine، بیماران دارای اختلال مصرف ماده ی MDMA

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1671936>

