

عنوان مقاله:

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بهوزان مراکز بهداشت شماره ۱ و ۲ اصفهان در خصوص عوامل خطر سرطان‌های دستگاه گوارش (کولورکتال) در سال ۱۳۹۹

محل انتشار:

فصلنامه تحقیقات نظام سلامت، دوره ۱۸، شماره ۴ (سال: ۱۴۰۱)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۹

نویسنده‌گان:

MSc Student, Department of Community Education, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran – مریم جلال پور –

Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran – محمد جواد طراحی –
Iran

Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran – قاسم یادگارفر –
AND School of Medicine, University of Preston, England

خلاصه مقاله:

مقدمه: سرطان‌های دستگاه گوارش یکی از برخطترین و شایع‌ترین نوع سرطان در ایران می‌باشد. این بیماری در مرد، معد، کلوون و رکتوم شیوع بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهوزان شاغل در خصوص عوامل خطر سرطان‌های دستگاه گوارش انجام شد. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، تمام ۱۷۵ بهوزان زن و مرد شاغل در مراکز بهداشت شماره ۱ و ۲ اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد که میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهوزان را مورد سنجش قرار داد، جمع آوری گردید. نمرات خام آگاهی، نگرش و عملکرد با یک تبدیل خطی به نمرات استاندارد صفر تا ۱۰۰ تبدیل و با میانگین، انحراف معیار، حدود اطمینان ۹۵% درصد، میانه و دامنه چارکی توصیف شد. داده‌ها با استفاده از آزمون One-way ANOVA در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمرات آگاهی برای کل شرکت کنندگان، $3/69$ درصد [Confidence interval) = $85/66$ - $89/71$] درصد بود. میانگین نمرات نگرش $9/73$ درصد [CI ۹۵ = $52/72$ - $46/75$] درصد و میانگین نمرات رفتار $3/35$ درصد [CI ۹۵ = $43/33$ - $23/37$] درصد بود. اختلاف میانگین نمرات آگاهی، نگرش و رفتار بهوزان بر حسب جنسیت، وضعیت تأهل، سابقه فامیلی، ابتلا به بیماری‌های التهابی روده و سطح درامد معنی دار نبود. اما میانگین نمرات رفتار افراد با سطح سواد دبیلم و زیر دبیلم معنی دار بود ($P = 0.46$). با افزایش سن، نمره رفتار افزایش داشت ($P = 0.07$). همبستگی مثبت خطی معنی داری بین سابقه کار و نمره رفتار ($P = 0.04$) و ($P = 0.218$) مشاهده شد و ارتباط جنسیت با رفتار تغذیه‌ای معنی دار بود ($P = 0.39$). میانگین نمرات آگاهی افرادی که نیاز به تست دوره ای دارند، $6/76$ بود و نسبت به افرادی که نیاز به تست دوره ای ندارند، با اختلاف زیادی معنی دار بود ($P = 0.26$). نتیجه گیری: با افزایش سن و سابقه خدمت، نمره رفتار افزایش پیدا کرد. همچنین، میانگین رفتار تغذیه‌ای در بهوزان مرد نسبت به بهوزان زن کمتر بود. افرادی که نیاز به تست دوره ای دارند، آگاهی بالاتری داشتند. بنابراین، علاوه بر داشتن افرایی، به اتخاذ سایر سیاست‌های بهداشتی نیاز است تا بتوان با غلبه بر موضع انجام رفتارهای پیشگیرانه، نه تنها عملکرد بهوزان، بلکه با خدمات رسانی به جماعت‌های تحت پوشش، مشارکت مردم را در برنامه‌های غربالگری سرطان کولورکتال افزایش داد.

کلمات کلیدی:

کارکنان سلامت، آگاهی، نگرش، سرطان کولورکتال، Health personnel, Knowledge, Attitude, Colorectal cancer, Risk factors

عوامل خطر

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1677157>

