

عنوان مقاله:

مقایسه تاثیر کرم واژینال شیرین بیان با کلوتریمازول بر علائم ولوواژینیت قارچی

محل انتشار:

نشریه پرستاری ایران، دوره 32، شماره 117 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

ندا دو دانگه - *MS in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

معصومه خیرخواه - *Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Nursing Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Corresponding author)*
Tel: ۰۹۱۲۴۷۸۷۶۹۱ Email: kheirkhah.m@iums.ac.ir

جمیله ابوالقاسمی - *Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

فراز مجاب - *Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

فاطمه فرشاد - *Dentistry Student, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: قارچ کاندیدا مسئول ۹۰-۵۰ درصد عفونت های دستگاه تناسلی زنان است. مقاومت ایجاد شده در برابر داروهای آزول، ضرورت تحقیق داروهای جدید در درمان عفونت های واژینال را مطرح نمود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر کرم واژینال شیرین بیان با کلوتریمازول بر علائم ولوواژینیت قارچی انجام شد. روش بررسی: مطالعه یک کارآزمایی بالینی سه سوکوراست که بر روی ۶۰ زن مبتلا به واژینیت قارچی انجام شد. معیار ورود داشتن دو علامت از علائم ولوواژینیت قارچی (خارش، سوزش، ترشح سفید پنیری، درد حین مقاربت و سوزش ادرار) و اسمیر واژینال مثبت بود. واجدین شرایط پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه با انتخاب یکی از کارت های A، B به یکی از گروه ها تخصیص داده می شدند. بیماران هر شب یک اپلیکاتور از کرم واژینال کلوتریمازول یا شیرین بیان را که در تیوب های ۵۰ میلی گرمی مشابه که از قبل با حروف A، B توسط داروساز مشخص شده بود، استعمال می کردند. ابزار گردآوری اطلاعات فرم ثبت اطلاعات جمعیت شناختی و باروری، چک لیست مشاهدات بالینی و فرم ثبت نتایج اسمیر واژینال بود. پس از تکمیل دوره درمان هفت روزه مجدداً در درمانگاه زنان، از نمونه های پژوهش معاینه و اسمیر واژینال انجام می شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و با آزمون های آماری کای دو، مک نمار و روش معادلات برآوردگر تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج اسمیر واژینال و بهبود علائم ترشح، درد حین مقاربت، سوزش و تحریک در گروه های تحت درمان با کلوتریمازول و شیرین بیان مشابه بود، بهبود علائم خارش و سوزش ادرار در گروه کلوتریمازول بهتر از شیرین بیان بود. نتیجه گیری کلی: کرم واژینال شیرین بیان می تواند به عنوان نوعی درمان جانبی در کنار درمان های اصلی در زنانی که تمایل به استفاده از داروهای گیاهی دارند به کار برده شود. لذا می توان تجویز آن را به ماماها و متخصصین زنان توصیه نمود.

کلمات کلیدی:

Vulvovaginitis, Candida, Glycyrrhiza glabra, Clotrimazole, ولوواژینیت، کاندیدا، شیرین بیان، کلوتریمازول

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1679898>

