

## عنوان مقاله:

بررسی میزان تبعیت پرسنل اتاق عمل از رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده ابتلا به کووید-۱۹: یک مطالعه مقطعی در ایران

## محل انتشار:

فصلنامه طب پیشگیری، دوره ۹، شماره ۴ (سال: ۱۴۰۱)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۱۶

## نویسندگان:

آرمین فریدونی - *Department of Educational Technology Operating Room, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz - University of Medical Sciences, Shiraz, Iran*

مریم فنواتی - *Department of Educational Technology Operating Room, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz - Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran*

اسماعیل تیموری - *Department of Educational Technology Operating Room, Faculty of Paramedical Sciences, AJA - University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

زهرا ملکی - *Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran*

سلیمان برسته - *Health Management Research Center, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

فاطمه ویزشفر - *Department of Educational Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran*

## خلاصه مقاله:

هدف: پرسنل اتاق عمل ارائه دهنده مراقبت های تخصصی در محیط اتاق عمل هستند؛ بنابراین تبعیت آن ها از دستورالعمل های محافظتی پیشگیری کننده از ابتلا به کووید-۱۹ خطر ابتلا به این بیماری را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تبعیت پرسنل اتاق عمل از رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از ابتلا به کووید-۱۹ در سال ۱۴۰۰ انجام شد. روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی روی ۸۷۶ نفر از پرسنل اتاق عمل در سال ۱۴۰۰ در ۱۰ شهر ایران انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود. در مرحله اول ۱۰ شهر (خوشه) انتخاب شد. در مرحله دوم، ۳ بیمارستان اصلی پذیرش کننده بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در هر کلان شهر به صورت تصادفی ساده (با استفاده از قرعه کشی) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل ۲ پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه محقق ساخته دستورالعمل های پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ در اتاق عمل بود که به صورت برخط برای مشارکت کنندگان ارسال شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ و توسط آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کای اسکوئر) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان  $28/5 \pm 5/4$  بود. بیشتر شرکت کنندگان خانم (۸۲/۳ درصد) و مجرد (۵۲/۶ درصد) بودند. میانگین میزان تبعیت پرسنل اتاق عمل  $42/29 \pm 7/11$  بود. ۵۶/۵ درصد از آن ها سطح تبعیت پایین، ۵۹/۴ درصد سطح تبعیت متوسط و ۳۴/۱ درصد سطح تبعیت بالا از دستورالعمل ها داشتند. بیشترین میزان تبعیت پرسنل در بعد دستورالعمل های تجهیزات حفاظت فردی و کمترین میزان آن در بعد دستورالعمل های نوع جراحی بود. بین شرکت در کارگاه آموزشی و میزان تبعیت پرسنل اتاق عمل از رفتارهای بهداشتی پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ ارتباط معناداری وجود داشت ( $P \leq 0/002$ ). نتیجه گیری: با توجه به متوسط بودن میزان تبعیت پرسنل اتاق عمل از دستورالعمل های محافظتی کووید-۱۹ و ارتباط معنادار بین شرکت در کارگاه آموزشی و میزان تبعیت در مطالعه حاضر، جهت افزایش این تبعیت توصیه می شود مدیران، برنامه هایی اجرایی را از طریق تامین تجهیزات و سوابق حفاظتی استاندارد و همچنین دوره های آموزشی مدون برای ارتقای حداکثری سطح آگاهی پرسنل اتاق عمل برنامه ریزی کنند.

## کلمات کلیدی:

,Operating room, Nursing, Preventive measures, Coronavirus, COVID-۱۹

اتاق عمل, پرستار, اقدامات پیشگیری کننده, ویروس کرونا, کووید-۱۹

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1686605>

