سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com

عنوان مقاله: عوامل مرتبط در بروز اشتباها ت دارویی پرستاران بخش روانپزشکی بیمارستان رازیشهر تبریز

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسندگان: مریم اسعدی آقاجری – گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، مراغه، ایرا ن

شیوا خیاطی مطلق بناب - گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، مراغه، ایرا ن

محمد عبدی - مشاورامور حقوقی، گروه پرستار ی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

شهرام پیری - گروه پرستا ری، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، مراغه، ایرا ن

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: خطاهای دارویی مهمترین عامل تهدید ایمنی بیمار دربیمارستان محسوب می شود و عوامل زیادی دروقوع آن مشارکت می کنند این مطالعه باهدف تعیین نقش عوامل مرتبط دربروز اشتباهات دارویی پرستاران بخش روانپزشکی بیمارستان رازی شهرتبریز سال ۱۳۹۷انجام شد زمینه و هدف: این مطالعه توصیفی تحلیلی با مشارکت ۲۵۰نفر ازپرستاران شاغل دربخش روانپزشکی بیمارستان رازی شهر تبریز با استفاده ازنمونه گیری تصادفی انجام شد ابزار جمع آوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و یک پرسشنامه محقق ساخته جهت ارزیابی عوامل موثردربروز خطاهای دارویی ازدیدگاه پرستاران بود داده ها وارد نرم افزار ۲۶۲۲ شد و با ازمون های اماری تی تست انالیزواریانس وپیرسون موردتجزیه تحلیل قرارگرفت یافته ها : در این مطالعه ۲۵ نفر (۱۳۶۳۳) مرد و ۵۵ نفر (۱۷۳۶%) زن با میانگین سنی ۲۹۶±۲۹ سال شرکت کردند. بیشترین میانگین نمره علل بروز اشتباهای حرفه ای پرستاران زو ۲۱/2±۳۲(۲ و ساختار بخش روانپزشکی (۲۸۴۵%) زن با میانگین سنی ۲۹۶±۲۹ سال شرکت کردند. بیشترین میانگین نمره علل بروز اشتباهای حرفه ای پرستاران (۲۰/2±۳۲(۲) و ساختار بخش روانپزشکی (۲۸۵±۲۹)بود. مهمترین علت بروز خطاها تغییر کاردکس هنگام انتقال بیمار به سایر بخش ها با میانگین ۵/۵۵±۲۹ بود. میانگین نمره اشتباهات دارویی با میزان و ساختار بخش روانپزشکی (۲۸۵±۲۹/۷)بود. مهمترین علت بروز خطاها تغییر کاردکس هنگام انتقال بیمار به سایر بخش ها با میانگین ۵/۵۵± ۲۰/۹۹ بود. میانگین نمره اشتباهات دارویی با میزان تحصیلات، سن ، سابقه کاری و نوع استخدام مرتبط و با جنسیت ، وضعیت تاهل ، موقعیت شغلی پرستار و گردش شیفت کاری بی ارتباط بود.نتیجه گیری : با توجه به بروز مهمترین اشتباهات دارویی با میزان در حیطه شغلی پرستاری و ساختار بخش رونپزشکی به مدیران پرستاری توصیه می گردد تا از طریق برگزاری کلاس های آموزشی مهارت تجویز دارو در پرسل افزایش عراز فرایط فیزیکی بخش اصلاح گردد.

> کلمات کلیدی: اشتباهات دارویی ، پرستار، بخش روانپزشکی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/1688863

