

عنوان مقاله:

پیش بینی آمادگی به اعتیاد در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس ادراک حمایت اجتماعی با میانجی گری خودکارآمدی درد و پذیرش درد

محل انتشار:

فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی، دوره 12، شماره 2 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

سارا بهزاد - Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

یحیی یاراحمدی - Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

فرشاد بهاری - Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

حمزه احمدیان - Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

خلاصه مقاله:

اهداف: درد سرطان، افکار و باورهای منفی در بیماران ایجاد می کند که می تواند سطح کارکرد و تحمل درد را در این بیماران تحت تاثیر قرار دهد. در چند دهه اخیر، مصرف مواد مخدر برای تسکین درد در بیماران دارای سرطان به طور چشمگیری بالا رفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی پذیرش درد و خودکارآمدی درد در ارتباط بین ادراک حمایت اجتماعی و آمادگی به اعتیاد انجام شد. مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی، زنان و مردان دارای سرطان شهر اراک در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بود. ۲۰۱ بیمار دارای سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اراک به روش نمونه گیری در دسترس (۹۷ زن و ۱۰۴ مرد) انتخاب شدند. تمامی نمونه ها مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده Zimet و همکاران (۱۹۸۸)، پرسش نامه خودکارآمدی درد (Nicholas ۱۹۸۰)، پرسش نامه درد مزمن vowels و همکاران (۲۰۰۴) و پرسش نامه آمادگی اعتیاد Wade و Butcher (۱۹۹۲) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۵ و Amos ۲۴ استفاده شد. یافته ها: ۲۰۱ بیمار با میانگین سنی ۵۳/۴۶±۱۰/۳۸ سال در این پژوهش شرکت کردند. نتایج حاکی از برآزش مطلوب مدل پژوهش بود. نتایج نشان داد که میان ادراک حمایت اجتماعی، پذیرش درد و خودکارآمدی درد با آمادگی به اعتیاد همبستگی منفی معنادار ($p < 0.001$) و میان ادراک حمایت اجتماعی با پذیرش درد و خودکارآمدی درد همبستگی مثبت معنادار ($p < 0.001$) وجود داشت. در مسیر غیرمستقیم، مدل میانجی ادراک حمایت اجتماعی میان خودکارآمدی درد و پذیرش درد با آمادگی اعتیاد در سطح معناداری ۰/۰۰۱ و ضریب استاندارد (-۰/۳۰) معنادار بود. نتیجه گیری: تقویت شبکه حمایت اجتماعی افراد، در کنار توسعه احساس خودکارآمدی و پذیرش جنبه های غیرقابل کنترل، می تواند به عنوان اهداف و برنامه های درمانی پیشگیرانه از حرکت بیماران به سوی مصرف مواد مخدر برای تسکین درد مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

Addiction, Cancer Pain, Social Support, Self-Efficacy, Pain

حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، درد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1693745>



