

عنوان مقاله:

بررسی رادیوگرافی ریه در بیماران مبتلا به سل

محل انتشار:

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 5، شماره 3 (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسنده:

جمشید آیت اللهی

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: سل ریه از عفونت های شایع و سل قسمت تحتانی ریه، تظاهر غیر معمول این بیماری می باشد که اغلب باعث تشخیص اشتباه می شود. در حال حاضر اپیدمی عفونت HIV و آیدز باعث افزایش بروز این تابلوی سل شده است. هدف این مطالعه تعیین شیوع سل قسمت تحتانی ریه در شرایط مختلف بالینی و آزمایشگاهی و پاسخ آن به درمان است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی بود. کلیه بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به درمانگاه نیکوپور یزد طی سال های ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۳ که دارای پرونده کامل سل بودند، وارد این مطالعه شدند. اسمیر و کشت خلط و قند خون برای کلیه بیماران و تعدادی از آزمایشات دیگر از جمله HIV، برای تعدادی از بیماران درخواست شد. یافته ها: از مجموع ۲۱۷ بیمار مبتلا به سل ریوی، ۴۳ نفر (۱۹/۸۱٪) گرفتاری قسمت تحتانی ریه داشتند. گرفتاری قسمت تحتانی ریه در خانم ها شایع تر ۲۴ نفر (۲۱/۸٪) از آقایان ۱۹ نفر (۱۷/۲۵٪) بود، ۴۱/۸۶٪ در گروه سنی بالاتر از ۶۰ سال بودند. و این تابلوی بیماری در افراد دیابتی شایع تر بود ۷ نفر (۲۸٪). گرفتاری یک طرفه ریه شایع تر ۱۱۳ مورد (۵۲٪) و طرف راست ریه به صورت شایع تری گرفتار بود ۱۰۲ مورد (۶۰٪). ۱۰۲ مورد تجمد (۴۷٪) و ۵۷ مورد حفره (۲۶٪) شایع ترین تظاهر رادیولوژیک این بیماران بود. نتیجه گیری: سل قسمت های مختلف ریه را گرفتار می نماید و گرفتاری قسمت تحتانی ریه در جریان بیماری سل نسبتا شایع است و در افراد دیابتی به طور شایع تری دیده می شود و در زنان سنین پایین نسبت به مردان بیشتر دیده می شود. تظاهرات بالینی گرفتاری قسمت تحتانی ریه مانند گرفتاری قسمت فوقانی ریه بوده و پاسخ به درمان آن نیز با درمان استاندارد مشابه می باشد. واژه های کلیدی: سل ریوی، سل قسمت تحتانی ریه، رادیوگرافی

کلمات کلیدی:

Pulmonary Tuberculosis, Lower Lung Field, Radiography, سل ریوی، سل قسمت تحتانی ریه، رادیوگرافی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1710274>

