

## عنوان مقاله:

ارتباط بین نوع زایمان و اسیدمی خون بند ناف نوزادان متولد شده در زایشگاه آیت الله کاشانی کرمان

## محل انتشار:

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 5، شماره 4 (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

## نویسنده:

فریبا امین زاده

## خلاصه مقاله:

ارتباط بین نوع زایمان و اسیدمی خون بند ناف نوزادان متولد شده در زایشگاه آیت الله کاشانی کرمان دکتر فریبا امین زاده دریافت مقاله: ۲۸/۴/۸۵ ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: ۱۵/۸/۸۵ دریافت اصلاحیه از نویسنده: ۲۴/۸/۸۵ پذیرش مقاله: ۲۹/۹/۸۵ چکیده زمینه و هدف: یکی از روش های ارزیابی وضعیت نوزاد، بررسی pH خون بند ناف است، اسیدمی گاه باعث عوارض دائمی و غیرقابل برگشت در نوزاد می شود. بعضی مطالعات نشان داده اند که اسیدمی نوزاد با نوع زایمان ارتباط دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین نوع زایمان و اسیدمی و ارتباط بین اسیدمی و عوارض نوزادی مثل آغشته شدن مایع آمنیون به مکونیوم و کاهش آپگار نوزاد بود. مواد و روش ها: مطالعه طولی بر روی ۲۰۰ نوزاد متولد شده از زایمان طبیعی و ۲۰۰ نوزاد متولد شده از سزارین انتخابی انجام شد. همه نوزادان ترم بودند. اطلاعات راجع به pH خون بند ناف، آپگار دقایق اول و پنجم و آغشته شدن مایع آمنیون به مکونیوم مورد بررسی قرار گرفت. منظور از اسیدمی pH کمتر از ۷/۱ بود. یافته ها: بروز اسیدمی در زایمان طبیعی ۵/۲۰٪ و در سزارین انتخابی ۳۶٪ بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. در این مطالعه اسیدمی با افت آپگار دقایق اول و پنجم و آغشته شدن مایع آمنیون به مکونیوم همراه بود. نتیجه گیری: در این مطالعه اسیدمی با نوع زایمان، آپگار دقایق اول و پنجم و استرس جنینی ارتباط داشت. واژه های کلیدی: زایمان واژینال طبیعی، سزارین انتخابی، اسیدمی بند ناف، آپگار

## کلمات کلیدی:

,Normal Vaginal Delivery, Elective C-section, Umbilical Cord Acidemia, Apgar Score  
زایمان واژینال طبیعی، سزارین انتخابی، اسیدمی بند ناف، آپگار

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1710292>

