

عنوان مقاله:

مقایسه پیامدهای حاملگی در زنان نخست زای بالا و پایین ۳۵ سال

محل انتشار:

نشریه پرستاری ایران، دوره 23، شماره 63 (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

آذر آقامحمدی

مریم نوری تاجر

معصومه خیر خواه

آغا فاطمه حسینی

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: امروزه بسیاری از زنان به دلایل بسیاری همچون دلایل شغلی، تحصیلی و اقتصادی اولین بارداری خود را حتی تا دهه چهل زندگی به تاخیر می اندازند، لذا حفظ سلامتی مادر و نوزاد مستلزم آگاهی کامل از پیامدهای حاملگی در این سنین، برای ماماها و متخصصین زنان است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه پیامدهای حاملگی در زنان نخست زای بالا و پایین ۳۵ سال انجام شده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقایسه ای بوده واحدهای پژوهش شامل ۵۰۹ زن نخست زای بودند که در فاصله زمانی بین اول فروردین ۱۳۷۹ تا آخر اسفند ۱۳۸۶ با سن حاملگی حداقل ۲۴ هفته زایمان کرده و پرونده آن ها در بیمارستان امام خمینی ساری موجود بود. نمونه ها به دو گروه بالای ۳۵ سال و ۲۰-۳۴ سال تقسیم شدند و پیامدهای حاملگی در هر گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مجذور کای و فیشر استفاده شد. یافته ها: در زنان نخست زای ارتباط معنی داری بین سن بالای ۳۵ سال و پره اکلپسی و دیابت بارداری و زایمان قبل از موعد و پرزانتاسیون معیوب و سزارین و وزن کم هنگام تولد وجود دارد. نتیجه گیری: حاملگی بالای ۳۵ سال می تواند حاملگی پر خطر محسوب گردد و با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، مسئولین بهداشت و درمان باید توجه ویژه ای بر بالا بردن سطح آگاهی زنان و همچنین ماماها، جهت داشتن نسلی سالم داشته باشند.

کلمات کلیدی:

,Nulliparous women – Preeclampsia - Premature delivery Malpresentation - Placenta previa - Low birth weight
نخست زای- پره اکلپسی- دیابت بارداری- زایمان قبل از موعد- پرزانتاسیون معیوب- جفت سر راهی- وزن کم هنگام تولد.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1714033>

