

## عنوان مقاله:

بررسی میزان رضایت بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته اند از مراقبتهای ارائه شده در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تهران سال ۱۳۷۱

## محل انتشار:

نشریه پرستاری ایران، دوره 12، شماره 16 (سال: 1377)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

## نویسندگان:

نصرت آریا  
دریادخت مسرور رودسری  
آناهید کریمی  
پرویز کمالی

## خلاصه مقاله:

این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی اثر لورازپام خوراکی بر کاهش استفراغ پس از عمل بیمارانی که با بیهوشی عمومی تحت جراحی کاتاراکت قرار می گیرند در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجام گرفته است. واحدهای مورد پژوهش تعداد ۸۰ نفر از بیمارانی بوده اند که با تشخیص پزشک و به علل مختلف ( پیری، مادرزادی، ضربه ای، بیماریهای سیستمیک و سمی) دچار کدورت عدسی شده اند و جهت عمل تصادفی در طول سه ماه مورد بررسی قرار گرفته اند. از این تعداد، چهل نفر در گروه "مورد" پیش داروی خوراکی لورازپام به میزان ۲۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن همراه با مقدار بسیار کمی آب ( ۱۰ سی سی ) نیم ساعت قبل از شروع بیهوشی داده شد و گروه شاهد پیش دارو دریافت نکرد. سپس دو گروه در طی دو مرحله بعد از عمل، مرحله اولیه (دو ساعت بعد از خاتمه بیهوشی) و مرحله تاخیری (۲۴ ساعت بعد از خاتمه بیهوشی) مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش برگه چک لیست بود که از طریق مشاهده، مصاحبه و اطلاعات موجود در پرونده، در طی دو نوبت قبل و بعد از بیهوشی تکمیل گردیده. یافته های این پژوهش در بیست جدول خلاصه شده اند. جهت حصول به نتایج پژوهش از آزمون کای دو و کوکرا ن استفاده شد. نتایج پژوهش اولین فرضیه پژوهش را حمایت نکرد. در مورد دومین فرضیه پژوهش نتایج حاصل از پژوهش ان را حمایت نموده و می توان نتیجه گیری کرد که پیش داروی خوراکی لورازپام بر کاهش استفراغ مرحله تاخیری موثر می باشد. آزمون اماری "کای دو" اختلاف معنی داری را بین دو گروه "مورد" و "شاهد" ( p < ۰۰۱/۰) نشان می دهد.

## کلمات کلیدی:

Kidney transplantation, Patient satisfaction, nursing care

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1714409>

