

## عنوان مقاله:

آنوریسم کاذب شریان رحمی پس از سزارین: گزارش مورد

## محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 23، شماره 2 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

## نویسندگان:

پژمان خوارزم - Assistant Professor of Vascular Surgery, Department of Surgery, School of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

فاطمه پولادخا - Master of Science in Operating Room, Instructor, Operating Room Department, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

طیبه آذر مهر - Master of Science in Operating Room, Instructor, Operating Room Department, School of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

فرحناز السادات احمدی - Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

فاطمه زهرا باقری - Master of Science in Operating Room, Shahid Sayad Shirazi Hospital, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

## خلاصه مقاله:

خونریزی شدید بعد از زایمان (Postpartum Hemorrhage: PPH) یک اورژانس مامایی غیر قابل پیش بینی و از علل عمده مورتالیتی و عوارض مادری در جهان است. آنوریسم کاذب شریان رحمی (Uterine Artery Pseudoaneurysm: UPA) یکی از علل نادر PPH است که به دنبال سزارین بدون عارضه و جراحی های ژنیکولوژیک مانند دیلاتاسیون و کورتاژ، هیستریکتومی و میومکتومی ایجاد می شود. راه درمانی مناسب برای کنترل خونریزی در این موارد آمبولیزاسیون شریان رحمی است. هدف ما از این گزارش معرفی بیماری با سابقه سزارین است که به دنبال خونریزی شدید رحمی با تشخیص آنوریسم کاذب شریان رحمی به طور موفق تحت آمبولیزاسیون شریان رحمی با استفاده از کوایل قرار گرفت. بیمار خانم ۳۹ ساله ای بود که ۵۵ روز بعد از عمل جراحی سزارین سوم با شوک همودینامیک در نتیجه خونریزی شدید واژینال، به بیمارستان مراجعه نمود و بستری شد. پس از انجام مراقبت های اولیه، اقدامات تشخیصی UAP را نشان داد و بلافاصله آمبولیزاسیون شریان رحمی به وسیله کوایل انجام شد. هرگاه اقدامات نگهدارنده معمول، نتواند خونریزی شدید دیبرس بعد از زایمان را کنترل کند؛ آنژیوگرافی و آمبولیزاسیون شریان رحمی روش درمانی انتخابی است که به واسطه آن می توان ضمن حفظ توانایی باروری بیمار، از عوارض بالقوه هیستریکتومی جلوگیری کرد.

## کلمات کلیدی:

Aneurysm False, Uterine Artery, Postpartum Hemorrhage, Uterine Artery Embolization, آنوریسم

کاذب، شریان رحمی، خونریزی شدید بعد از زایمان، آمبولیزاسیون شریان رحمی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1723520>

