

عنوان مقاله:

پیامد بیماران تشخیص شده از بخش اورژانس با تشخیص درد شکم غیراختصاصی

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 16، شماره 2 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندها:

Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Shohadaietajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, – محمد مهدی فروزانفر
Tehran, Iran

Emergency Medicine, Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, – حمید رضا حاتم آبادی
Tehran, Iran

Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Shohadaietajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, – بهروز هاشمی
Iran

Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Shohadaietajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, – علیرضا مجیدی
Tehran, Iran

Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, Shohadaietajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, – علیرضا برانلو
Iran

Assistant Professor, Shohadaietajrish Hospital, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran – علی شهرامی

Resident in Emergency Medicine, Department of Emergency Medicine, Imam Hosein Hospital, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran – محمود بارده

خلاصه مقاله:
 زمینه و هدف : علل درد شکمی غیرتوماتیک متنوع بوده و شامل وضعیت های خفیف تا شرایط وحیم تهدیدکننده حیات است. این مطالعه به منظور تعیین پیامد بیماران تشخیص شده از بخش اورژانس با تشخیص درد شکم غیراختصاصی انجام شد. روش بررسی : این مطالعه کوهروت روی ۲۴۷ بیمار مبتلا به درد شکم غیراختصاصی تشخیص شده از بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع) در سال های ۱۳۹۰-۸۹ انجام شد. پس از چهار هفته، ادامه یا بهبود درد، مراجعة مجدد به مراکز درمانی و تشخیص های احتمالی بعدی، بروز عوارض و مرگ از طریق پیگیری تلفنی بررسی شد. یافته ها : ۱۵۸ بیمار ادامه درد را تجربه کردند که ۷۱ بیمار (۴۵ درصد) به مراکز درمانی مراجعة مجدد نمودند که علت درد در ۴۵ بیمار (۲۸.۵%) مشخص گردید. شایع ترین علت درد با تشخیص قطعی سندروم روده تحریک پذیر (۳.۲%) بود. عوامل موثر در شناسایی علل درد شکمی شامل سابقه ابتلا به دردهای مشابه (OR=۴.۰۴, P=۰.۰۱)، وجود یافته های غیرطبیعی در سونوگرافی شکم (OR=۸.۲, P=۰.۰۵)، یافته غیرطبیعی در آنالیز ادراری (OR=۷.۴, P=۰.۰۲) و استمرار دردهای شکمی بیش از ۲ روز (OR=۴.۰۴, P=۰.۰۲) تعیین شد. نتیجه گیری : نتایج این مطالعه همانند سایر مطالعات انجام شده در سایر مناطق، بیشتر مراجعات با شکایت درد شکمی غیراختصاصی به تشخیص قابل قبولی منتهی نمی شوند و بیشتر آنها نیز بدون عارضه خاصی بهبود می یابند.

کلمات کلیدی:

درد شکم غیراختصاصی، پیامد، Nonspecific abdominal pain, Ultrasonography, Irritable bowel syndrome سونوگرافی، سندروم روده تحریک پذیر

لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1724017>

