

عنوان مقاله:

توزیع آناتومیک و هیستوپاتولوژیک پولیپ های دستگاه گوارش در گرگان (۸۷-۱۳۷۸)

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 16، شماره 1 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

رامین آذرهوش - Associate Professor, Department of Pathology, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

تقی امیریانی - Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

میترا رحیمی نژاد - General Physician

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: پولیپ های دستگاه گوارش شامل انواع غیرنئوپلاستیک و نئوپلاستیک یا پیش درآمد کارسینوم هستند. با توجه به رابطه این پولیپ ها و سرطان و افزایش سرطان های معدی - روده ای در سالیان گذشته؛ این مطالعه به منظور تعیین توزیع آناتومیک و هیستوپاتولوژیک پولیپ های دستگاه گوارش در گرگان طی ده سال انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی - مقطعی روی پرونده ۲۹۰ بیمار با پولیپ دستگاه گوارش مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی پنجم آذر گرگان در سال های ۸۷-۱۳۷۸ انجام شد. پولیپ از طریق کولونوسکوپی - آندوسکوپی و بیوپسی تشخیص داده شده بود. اطلاعات دموگرافیک از پرونده بیماران استخراج شد و تشخیص هیستومورفولوژیک نمونه ها تعیین گردید. یافته ها: ۵۶.۶٪ بیماران مرد بودند. ۱۹.۳٪ پولیپ ها در دهه شش زندگی بود. فراوانی هیستومورفولوژیکی به ترتیب شامل آدنوما (۵۴.۱٪)، هیپرپلاستیک (۱۹.۷٪)، التهابی (۱۳.۸٪) و نوع جوانان (۱۱.۴٪) بود. از بین پولیپ های آدنوماتو بیشترین فراوانی به نوع توبولار (۶۳٪) تعلق داشت و انواع ویلوس (۱۹.۱٪) و توبولوویلوس (۱۷.۹٪) در رتبه های بعدی قرار داشتند. ۸۷.۲٪ پولیپ ها در کولون و ۱۲.۸٪ در معده قرار داشتند. شایع ترین محل درگیری آناتومیکی در رکتوم (۳۰٪) و سپس سیگموئید (۲۶.۱٪) بود. نتیجه گیری: پولیپ آدنوماتو کولون فراوان ترین پولیپ دستگاه گوارش است.

کلمات کلیدی:

Polyp, Gastrointestinal, Adenoma, Rectum, Age, پولیپ، آدنوما، دستگاه گوارش، کولون، توبولار، توبولوویلوس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1724031>

