

عنوان مقاله:

بروز سرطان های دستگاه گوارش در تهران طی سال های ۱۳۷۷-۸۰

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرجان، دوره ۱۱، شماره ۴ (سال: ۱۳۸۸)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندها:

مهدي خباز خوب

سيدمحمدعلی محققى

سيدعلي رضا موسوى جراحى

على چواهرفروش زاده

محسن پذارم فر

على مرادي

بيژن رضوان

على خلفى

نيکو كياست فرد

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: سرطان سومین علت مرگ و میر در کشور ما پس از بیماری های قلبی و تصادفات می باشد. این مطالعه به منظور تعیین بروز سرطان های دستگاه گوارش در تهران طی سال های ۱۳۷۷-۸۰ انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی جمعیت ساکن در مناطق شهر تهران، شمیرانات و اسلامشهر به عنوان جمعیت در معرض خطر در نظر گرفته شدند. داده های ثبت سرطان به صورت فعال از مراکز آسیب شناسی و پایگانی مدارک پزشکی جمع آوری گردید. مواردی که بین سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ سرطان آنها براساس ICD-10 تشخیص داده شده بود و حداقل یک سال ساکن تهران بودند؛ به عنوان موارد سرطانی محسوب شدند. میزان بروز انواع سرطان ها براساس ساختار سنی جمعیت جهان تطبیق یافت و میزان های بروز از تقسیم میزان کل این دوره به ۴ به صورت سالیانه محاسبه شد. یافته ها: میزان بروز سالیانه اختصاصی سنی و استاندارد شده سرطان معده در مردان و زنان به ترتیب ۹/۱۲ و ۸/۵ در صدهزار نفر تعیین شد. این میزان به صورت خام برای مردان و زنان ۱/۴ و ۲/۹ در صدهزار نفر بود. بروز سرطان معده در زنان و مردان گروه های سنی بالاتر بیشتر مشاهده بود. میزان بروز سالیانه اختصاصی سنی و استاندارد شده سرطان کلولون در مردان و زنان به ترتیب ۷/۵ و ۴/۵ در صدهزار نفر تعیین گردید و این میزان به صورت خام در ۳/۴ و ۴ در صدهزار نفر بود. میزان بروز سالیانه اختصاصی سنی و استاندارد شده سرطان مری در جمعیت مورد بررسی به ترتیب ۹/۳ و ۶/۳ در صدهزار نفر مشاهده شد. همچنین این میزان به صورت خام ۷/۳ و ۷/۲ در صدهزار نفر بود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که سرطان معده شایع ترین سرطان در تهران می باشد. لذا شناسایی عوامل موثر و پیشگیری از آن ضرورت دارد.

كلمات کلیدی:

Tehran, Cancer, Gastrointestinal, Incidence, سرطان، بروز، سرطان، دستگاه گوارش، Cancer, Gastrointestinal, Incidence, Tehran

لينك ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1724344>