

عنوان مقاله:

اپیدمیولوژی ترومای غیرنافذ شکمی در گرگان (۱۳۸۰-۸۴)

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره ۱۰، شماره ۴ (سال: ۱۳۸۷)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۵

نویسندگان:

محمد رضا مطیع

ناصر بهنام پور

حمید علی نژاد

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: در ایران تروما دومین علت مرگ و میر در تمام سنین بوده و سالیانه هزینه زیادی را بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل می کند. ترومای شکم بخش عمده ای از تروماها را تشکیل می دهد. این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های شخصی و آسیب شناسی بیماران مبتلا به ترومای غیرنافذ شکمی در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر ویژگی های شخصی و آسیب شناسی ۲۳۹ بیمار با ترومای غیرنافذ شکمی بستری در بخش جراحی مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان طی سال های ۱۳۸۰-۸۴ ثبت شد. یافته ها: از ۲۳۹ نفر ۱۹۷ نفر مرد (۴/۸۲ درصد) و ۴۲ نفر زن (۶/۱۷ درصد) بودند که میانگین سنی ۴/۲۳ و میانگین مدت بستری ۸/۸ روز داشتند. شایع ترین علت ترومای غیرنافذ شکم حوادث ترافیکی بود. شایع ترین اندام آسیب دیده طحال (۱۱۸ نفر با ۴/۴۹ درصد) و کبد (۵۱ نفر با ۳/۲۱ درصد) بود. ۱۶۶ نفر (۵/۶۹ درصد) هم زمان دارای تروما در سایر نقاط بدن بودند. مرگ و میر ۳/۱۶ درصد و علت اصلی آن شوک هیپوولمیک بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه با نتایج سایر مطالعات انجام شده در سایر نقاط ایران مشابهت دارد و لازم است در زمینه پیشگیری و کاهش حوادث ترافیکی در شهر گرگان برنامه کاملی طراحی گردد.

کلمات کلیدی:

Trauma, Blunt trauma, Abdomen, Spleen, Liver, تروما, ترومای غیرنافذ, شکم, طحال, کبد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1724368>

