

## عنوان مقاله:

فراوانی اختلال وسواسی - اجباری در بیماران اسکیزوفرنیک بستری براساس مصاحبه بالینی ساختاریافته مبتنی بر DSM-IV (SCID)

## محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 9، شماره 1 (سال: 1386)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

## نویسندگان:

مریم پاکروان

میرفرهاد قلعه بندی

کاوه علوی

عزیزه افخم ابراهیمی

## خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: شیوع مادام العمر اسکیزوفرنی در ایالات متحده ۱ تا ۵/۱ درصد برآورد شده است و مطالعات مختلف نشان داده که بین ۸/۷ تا ۶/۴ درصد این افراد دچار علائم وسواسی اجباری هستند. تفاوت در این آمار تا حدی به روش های ارزیابی و درمان های انجام شده بستگی دارد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی این اختلال در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری انجام شد. روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی ۹۶ بیمار (۵۶ مرد و ۴۰ زن) دچار اسکیزوفرنی (براساس معیار تشخیصی DSM-IV) که در بیمارستان روانپزشکی ایران بستری بودند، براساس نمونه گیری در دسترس انتخاب و به وسیله مصاحبه بالینی استاندارد (SCID) از لحاظ ابتلا به اختلال وسواسی اجباری بررسی شدند. یافته ها: دامنه سنی این بیماران ۱۷ تا ۷۳ سال و میانگین سنی آنان  $۳۵ \pm ۱۲/۱۲$  بود. اکثریت بیماران (۵/۸۸ درصد) مبتلا به نوع پارانوئید اسکیزوفرنی بودند. براساس مصاحبه بالینی ۴۷ نفر (۴۹ درصد) دچار علائم وسواسی - اجباری بودند. متوسط سن شروع اسکیزوفرنی در کل بیماران  $۷/۲۴ \pm ۸/۸$  و متوسط سن شروع وسواس در افراد مبتلا  $۲/۲۰ \pm ۷/۶$  بود. در ۱۷ درصد افراد دو اختلال هم زمان ایجاد شده بود و در ۸/۲۰ درصد اسکیزوفرنی زودتر تظاهر یافته بود. نتیجه گیری: در مطالعه ما، نزدیک به نیمی از بیماران اسکیزوفرنیک بررسی شده دچار اختلال وسواسی-اجباری نیز بودند که همراهی قابل توجهی را نشان می دهد. با این حال براساس مطالعه حاضر نمی توان روابط علیتی را بین دو اختلال مشخص نمود.

## کلمات کلیدی:

OCD, Schizophrenia, Clinical Interview, اختلال وسواسی، اجباری، اسکیزوفرنیا، مصاحبه بالینی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1724473>

