

عنوان مقاله:

عوامل مرتبط با اسهال پایدار در کودکان زیر ۵ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی و خانه‌های بهداشت روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان گرگان و آق قلا

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره ۴، شماره ۲ (سال: ۱۳۸۱)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسنده‌گان:

عبدالله عباسی

محمد رضا یوسفی

خلاصه مقاله:

اسهال به عنوان یکی از علل عمده مرگ در بین کودکان کشورهای در حال توسعه می‌باشد و نیمی از این مرگ‌ها ناشی از اسهال پایدار است. این پژوهش به منظور تعیین عوامل مرتبط با اسهال پایدار کودکان زیر ۵ سال مناطق روستایی، روی ۷۰۸ کودک مبتلا به اسهال حاد در سال ۱۳۷۷ در روستاهای شهرستان گرگان و به شیوه تحلیلی - مقطعي انجام شده است. برای انجام این پژوهش ابتدا با روش مصاحبه چهره به چهره و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر و استخراج بعضی از متغیرها از پرونده خانه بهداشت، برای کودک مبتلا به اسهال حاد پرسشنامه تکمیل گردید. سپس در مرحله دوم، بعد از ۱۴ روز از شروع اسهال حاد، به منزل مسکونی کودک مراجعت شد و پرسشنامه مرحله دوم تکمیل گردید. عوامل خطر آفرین مرتبط با افزایش پایداری اسهال حاد که با انجام این پژوهش شناخته شده اند شامل سن کودک مبتلا به اسهال حاد، قومیت کودک مبتلا، مدت زمان استفاده از شیرمادر، کلربینه بودن آب آشامیدنی و غذای مصرفی کودک در زمان اسهال حاد می‌باشد. نتیجه این پژوهش مشخص نموده است ۱۱ درصد موارد اسهال حاد کودکان مورد مطالعه شکل پایدار به خود گرفته اند، یعنی بیش از ۱۴ روز از شروع اسهال، ادامه داشته اند. بنابراین با کنترل برخی عوامل خطرآفرین مرتبط می‌توان میزان مرگ و میرهای ناشی از اسهال را کاهش داد.

کلمات کلیدی:

اسهال, Persisted diarrhea, Under ۵ years old children, Ethnicity, Breast-feeding, Children sex, Effective factors

پایدار، کودکان زیر ۵ سال، قومیت، شیر مادر، جنس کودک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1724635>

