

عنوان مقاله:

شیوع عود زایمان زودرس و عوامل مرتبط با آن در شهر ایلام

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 21، شماره 10 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

راژان چهره - دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

ذلیخا کرم الهی - کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

آزاده عیوضی - کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

میلاذ برجی - کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

اعظم صفار - استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: زایمان زودرس و عود آن، تبعات درازمدتی برای خانواده ها و جوامع دارد، بنابراین ارزیابی عوامل اپیدمیولوژیک و زیست محیطی برای تشخیص زنان در معرض خطر زایمان زودرس، حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع عود زایمان زودرس و عوامل مرتبط با آن انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۹۴-۱۳۹۳ بر روی ۳۷۶۳ زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه شهید مصطفی خمینی (ره) شهر ایلام انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته و شامل ۳۷ سوال بود که اطلاعات مربوط به متغیرهای فردی، تاریخچه مامایی و طبی مادری و متغیرهای جنینی (سن حاملگی، تعداد زایمان های قبلی، وزن تولد، آپگار، مرگ پری ناتال، ناهنجاری مادر زادی، سابقه زایمان زودرس قبلی، پرزانتاسیون، اختلالات جفت، سابقه سقط، سابقه فشارخون، دیابت در بارداری، سابقه ضربه و جراحی، اختلالات ساختمانی رحم و سرویکس، پارگی زودرس کیسه آب) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۹) و آزمون های آماری کای اسکوئر و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از ۵/۰ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: از مجموع ۳۵۰ مورد زایمان زودرس، ۲۸۹ نفر (۸۲/۴٪) سابقه زایمان زودرس نداشتند و ۶۱ نفر (۱۷/۴٪) دارای سابقه زایمان زودرس قبلی بودند. بیشترین عود زایمان زودرس در سنین ۴۰-۳۱ سالگی یافت شد. بین سن، سطح تحصیلات، پاریته، عفونت تناسلی، عفونت ادراری، سابقه جراحی، دیابت، مرگ جنین، ناهنجاریهای جنینی و عود زایمان زودرس ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد ($p < 0.05$). نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن شیوع عود زایمان زودرس در زنانی که سابقه زایمان زودرس دارند، می توان با افزایش مراقبت های بالینی و یافتن عوامل موثر در زایمان زودرس، از عود آن پیشگیری کرد و از شیوع عود زایمان زودرس کاست.

کلمات کلیدی:

زایمان زودرس، شیوع، عود

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1727748>



