

عنوان مقاله:

بررسی داروهای ضد تشنج در مادر باردار و شیوع عوارض آن در جنین و نوزاد در استان کردستان ۱۳۹۳-۱۳۹۰

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 19، شماره 16 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

پیام خماند - استادیار گروه نورولوژی، بخش نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

قباد مرادی - استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کردستان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

فریبا فرهادی فر - استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

بهروز احسن - استادیار گروه نورولوژی، بخش نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

پریا کرم بیگی - پزشک عمومی، بخش نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: مصرف داروهای ضد تشنج در حاملگی بدون عارضه نیست. طی سال های اخیر مطالعات اندکی خصوصا در ایران در این زمینه انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع ناهنجاری های جنینی و عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده از مادران باردار مصرف کننده داروهای ضد تشنج انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی ۵۹ مادری که طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۰ در بیمارستان بعثت سنندج استان کردستان زایمان کرده و سابقه تشنج و مصرف داروهای ضد تشنج داشتند، انجام شد. داده ها از طریق بررسی پرونده ها و تکمیل پرسشنامه و پیگیری تلفنی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار Stata (نسخه ۱۲) و آزمون های توصیفی، کای دو و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: ۳ مورد (۲/۵٪) از مادرانی که سابقه تشنج و مصرف داروی ضد تشنج در دوران بارداری را داشتند، صاحب فرزندی با ناهنجاری شدند. در مادرانی که سابقه تولد نوزاد ناهنجر داشتند، هیچ گونه ناهنجاری مشاهده نشد. بین میانگین مدت زمان مصرف دارو ($p=۳۳/۰$)، میانگین سن ($p=۴۹/۰$) و ناهنجاری نوزادان در مادران ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: شیوع ناهنجاری های جنینی در مادران باردار مصرف کننده داروی ضد تشنج در کردستان کمتر از مطالعات مشابه در برخی کشورها است، هر چند قابل تعمیم به جامعه ایرانی نیست. مصرف برخی داروهای ضد صرع در طول بارداری برای زنان مبتلا به تشنج منعی ندارد. مدت زمان مصرف دارو، سن، سابقه سقط قبلی، سابقه ناهنجاری قبلی و نیز افزایش گراویدیتی نمی توانند در ایجاد ناهنجاری های جنینی نقشی داشته باشند.

کلمات کلیدی:

بارداری، تشنج، داروی ضد تشنج، ناهنجاری نوزادی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1728101>



