سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com

عنوان مقاله:

بررسی ارتباط سن مادر و فصل با بروز پره اکلامپسی در بیماران بستری در بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع) در طی ۳ سال (۸۳–۱۳۸۰)

محل انتشار: مجله زنان، مامایی و نازایی ایران, دوره 19, شماره 8 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان: مرضیه لطفعلی زاده – دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

معصومه خوش سيما - رزيدنت گروه زنان و مامايي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: پره اکلامپسی یکی از بیماری های شایع دوران بارداری است و اتیولوژی های مختلفی از جمله تغییرات فصلی، طول مدت شبانه روز و تغییرات دمایی برای آن عنوان شده است تا در صورت وجود ارتباط، اقدامات پیشگیرانه در فصول مربوطه پیشنهاد شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سن و فصل بر روی بروز پره اکلامپسی انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۲۶۴ نفر از بیماران مبتلا به پره اکلامپسی که طی سال های ۸۳–۱۳۸۰ در بخش زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ۲۰۲۹ زایمان بدون عارضهای که در مدت این سه سال انجام شده بود، به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. سن هر بیمار و فصل بروز بیماری در هر گروه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه (نمود ها) و آزمون های آماری کای دو، همبستگی پیرسون و واریانس یک طرفه انجام شد. میزان p کمتر از ۵۰۵۰ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه شیوع پره اکلامپسی ۲۳۷٪ بود. بروز پره اکلامپسی در مادران کمتر از ۱۵ سال ۲۵/۵%، در سن بالای ۳۵ سال ۶۸/۵۶% و در مادران بین ۳۵–۱۳۵ ان می ۲۲/۳ بود. بروز پره اکلامپسی در مادران کمتر از ۱۵ سال ۲۵/۱۲%، در سن بالای ۳۵ سال ۶۸/۵۶% و در مادران بین ۳۵ – ۱۵ سال، ۲۲/۲ بود. بین شیوع پره اکلامپسی در فار ایمان بروزی با گروه ۱۵ تا ۲۵ سال اختلاف معنی داری وجود داشت (۵۰/۵۰ میل در اسفند ماه (۵۵/۵۳) و کمترین شیوع در تیر ماه (۲۰/۱۸)» بود. سین شیوع پره اکلامپسی در فصل زمستان بیشترین سال اختلاف معنی داری وجود داشت (۶۰/۵۰)، در سن بالای ۳۵ سال ۶۸/۵۶% و در مادران بین ۳۵ – ۱۵ سال، ۲۲/۲ بود. بین شیوع پره اکلامپسی در فصل زمستان بیشترین سیال اختلاف معنی در دو داران کمتر از ۱۵ سال ۲۰/۵۶» و در مادران بین ۳۵ – ۱۵ سال، ۲۲/۲ بود. بین شیوع پره اکلامپسی در دو انتهای سن باروری با گروه ۱۵ تا ۲۵ سال اختلاف معنی در دو دارش دارت (۶۰/۵۰ مین در اسفند ماه (۳۵/۵۳)) و کمترین شیوع در تیر ماه (۲۰/۱۰ %) بود. شیوع پره ایستان بیشترین (۳/۵۰%) و در فصل تابستان کمترین (۶/۱۹۶) میزان را داشت. تفاوت معنی داری بین شیوع پره اکلامپسی در دو سی بازوری باشد. اکلامپسی در دو انتهای سن باروری بیشتر است. (۱۰ مالامپسی در فصول سرد سال بیشتر و در فصول گرم سال کمتر می باشد.

> کلمات کلیدی: پره اکلامپسی, تغییرات فصلی, سن باروری

لينک ثابت مقاله در پايگاه سيويليکا:

https://civilica.com/doc/1728125

