سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها ^گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com

عنوان مقاله: نیازهای زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی برای انجام آزمایش پاپ اسمیر

محل انتشار: مجله زنان، مامایی و نازایی ایران, دوره 19, شماره 6 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

We Respect the Science

نویسندگان: آرزو فلاحی – استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

بابک نعمت شهر بابکی - کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، مرکز بهداشت شهرستان سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

معصومه هاشمیان – استادیار گروه آموزش بهداشت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

اسدالله احمدى كهنعلى - كارشناس ارشد اپيدميولوژى، معاونت بهداشتى، دانشگاه علوم پزشكى جيرفت، جيرفت، ايران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: سرطان رحم چهارمین سرطان شایع در بین زنان ایرانی است. اکثر زنان آزمایش پاپ اسمیر که یک ابزار غربالگری جهت پیشگیری از سرطان رحم است را به عنوان یک روش معمول انجام نمی دهند. مطالعه حاضر با هدف تبیین نیازهای زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی– درمانی شهر ورامین برای انجام آزمایش پاپ اسمیر انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر بر پایه رویکرد کیفی در سال ۱۳۹۴ در شهر ورامین انجام گرفت. ۱۵ زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی– درمانی از طریق نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه ها ی عمیق نیمه ساختار شامل ۷ مصاحبه فردی و دو مصاحبه گروهی از گروه زنان دارای تجربه آزمایش پاپ اسمیر و نیز مشاهده و یاداشت برداری جمع آوری شدند. تمام مصاحبه ها ضط و تایپ شد و از نرم افزار MAXQDA (نسخه فردی و دو مصاحبه گروهی از گروه زنان دارای تجربه آزمایش پاپ اسمیر و نیز مشاهده و یاداشت برداری جمع آوری شدند. تمام مصاحبه ها ضبط و تایپ شد و از نرم افزار ۲۰۱۸ (نسخه ۱۳۰۰) جهت فرایند کدگذاری و طبقه بندی داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی انجام گرفت. جهت صحت داده ها از معیارهای تاییدپذیری، اعتبار پذیری و انتقال پذیری استفاده شد. یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی انجام گرفت. جهت صحت داده ها از معیارهای تاییدپذیری، اعتبار پذیری و انتقال پذیری استفاده شد. یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی انجام گرفت. جهت صحت داده ها از معیارهای تاییدپذیری، اعتبار پذیری و انتقال پذیری استفاده شد. یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها چهار طبقه اصلی شامل "تهدید درک شده"، "رفع موانع فرهنگی– محیطی"، "ایجاد انگیزه" و "تقویت ویژگی های فردی" استخراج گردید. نتیجه گیری: انجام آزمایش پاپ اسمیر جهت پیشگیری از سرطان منوط به تعامل مناسب و صمیمی با پرسنل بهداشتی و درمانی، حمایت خانواده، سیاست ها و قوانین تشویق کننده و اطلاع رسانی و هماهنگی سازمان ها است

> کلمات کلیدی: آزمایش پاپ اسمیر, رویکرد کیفی, زنان, مراکز بهداشتی- درمانی

> > لينک ثابت مقاله در پايگاه سيويليکا:

https://civilica.com/doc/1728131

