

عنوان مقاله:

فراوانی تریکوموناس واژینالیس در نمونه های پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به بیمارستان نفت اهواز طی سالهای ۹۳-۱۳۸۴

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 18، شماره 186 (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

ملوک بیرم وند - استادیار گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

رویا دانش بختیار - دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: تریکوموناس واژینالیس، یکی از شایع ترین عفونت های جنسی است که با وجود شیوع بالای ۷۵-۵٪ و پیامدهای نامطلوب بهداشتی و بارداری، توجه اندکی در سطح جهانی به آن شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی تریکوموناس واژینالیس در زنان مراجعه کننده به بیمارستان نفت اهواز بر اساس تست پاپ اسمیر انجام شد. روش کار: در این مطالعه مقطعی- توصیفی و گذشته نگر ۳۷۳۳۲ مورد از پروندههای پاپ اسمیر دریافت شده از آزمایشگاه بیمارستان نفت اهواز طی سالهای ۹۳-۱۳۸۴ از لحاظ ابتلاء به انگل تریکوموناس واژینالیس مورد بررسی قرار گرفتند. در میان نمونههای مثبت دریافتی علائمی نظیر التهاب، آلودگی های قارچی و باکتریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۲۱) و آزمون کای دو انجام شد. میزان P کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: از مجموع ۳۷۳۳۲ پرونده مورد بررسی، ۳۱۲ مورد (۰/۸۳٪) آلوده به تریکوموناس واژینالیس بودند. از بین ۳۱۲ نمونه مورد مطالعه، ۲۴۰ نفر (۹/۷۶٪) دارای التهاب واژینال، ۲۶ نفر (۳/۸٪) دارای عفونت قارچی و ۸۹ نفر (۵/۲۸٪) دارای عفونت باکتریایی بودند. ۶۸۶۹ نفر (۴/۱۸٪) از مراجعه کنندگان ۱ مورد سقط و ۲۲۷۷ نفر (۱/۶٪) ۲ مورد سقط داشتند که بین آلودگی به انگل تریکوموناس واژینالیس و تعداد سقط تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت (۰/۰۵).

کلمات کلیدی:

تریکوموناس واژینالیس، واژینیت تریکومونیایی، اهواز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1728146>

