

## عنوان مقاله:

گزارش یک مورد نادر هیستریکتومی به دلیل پلاستیکاکرتا در یک زن نخست زای در سن بالا

## محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 18، شماره 140 (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

## نویسندگان:

لیلا پورعلی - استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

منصوره گل محمدی - رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

صدیقه آیتی - دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

سمیه معین درباری - رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

## خلاصه مقاله:

مقدمه: چسبندگی های غیر طبیعی جفت به عنوان یک عامل مهم تهدید کننده حیات در مامایی به شمار می روند. این مسئله مهم، یک مشکل در حال رشد در دهه های اخیر به دلیل سن بالای مادر و انجام بیشتر سزارین اتفاق می افتد. مطالعه حاضر با هدف گزارش یک مورد نادر هیستریکتومی به دلیل پلاستیکاکرتا در یک زن نخست زای بالا انجام شد. معرفی مورد: بیمار یک خانم ۳۶ ساله نخست زای با بارداری ۲۶ هفته بود که به دلیل پارگی زودرس کیسه آب و خونریزی واژینال بستری شد. بیمار به دلیل کوریوآمینیونیت در سن بارداری ۲۶ هفته و ۴ روز جهت زایمان واژینال اینداکشن شد و بلافاصله پس از زایمان به دلیل خونریزی شدید غیر قابل کنترل تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفت و در نهایت به دلیل عدم کنترل خونریزی با اقدامات نگهدارنده طبی و جراحی، هیستریکتومی انجام شد که در نتیجه پاتولوژی نمونه هیستریکتومی جفت اکرتا گزارش شد. نتیجه گیری: شیوع رو به افزایش چسبندگی غیر طبیعی جفت می تواند ناشی از افزایش سن مادر باشد. یکی از استراتژی های لازم برای جلوگیری از این عارضه تهدید کننده حیات، توصیه به ازدواج و بارداری در سنین پایین تر می باشد.

## کلمات کلیدی:

جفت اکرتا، سن مادر، هیستریکتومی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1728279>

