

**عنوان مقاله:**

بررسی اثر میزپرتوستول زیر زبانی در پیشگیری از خونریزی در عمل جراحی سزارین

**محل انتشار:**

مجله زنان، مامایی و نازلی ایران، دوره 17، شماره 125 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

**نویسنده‌گان:**

زهرا سلیمانی - متخصص زنان زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، تهران، ایران.

افسانه آفرازه نایینی - دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

**خلاصه مقاله:**

**مقدمه:** میزپرتوستول یک داروی منقبض کننده رحمی قوی است که بر اساس نتایج مطالعات انجام شده، در جلوگیری و درمان خونریزی پس از زایمان موثر است. اما مطالعات محدودی در زمینه تاثیر آن در خلال اعمال جراحی سزارین و جلوگیری از خونریزی پس از آن انجام گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر میزپرتوستول زیر زبانی در پیشگیری از خونریزی در سزارین انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۸۷ بر روی ۱۸۶ زن که در بیمارستان شهدای تجریش داوطلب عمل سزارین بودند، انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه میزپرتوستول + اکسی توسین و دارونما + اکسی توسین قرار گرفتند. افراد به صورت تصادفی، ۴۰۰ میکروگرم میزپرتوستول زیر زبانی با پلاسبو بالا فاصله بعد از کلامپ بند ناف دریافت کردند. تمام بیماران یک محلول رقیق اکسی توسین به صورت انفузیون وریدی در هنگام خروج جفت نیز دریافت کردند. متغیرهایی، تعیین میزان خونریزی حین عمل با استفاده از اختلاف میزان هموگلوبین و هماتوکربیت قبل و بعد از عمل بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۵) و آزمون‌های تی، کای دو یا تست دقیق فیشر انجام شد. مقدار  $p$  کمتر از ۰.۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: دو گروه از نظر میانگین سن، پاریتی، سن بارداری و وزن جنین، علت سزارین، نوع بیهوشی، طول مدت جراحی و سایر متغیرهای حین زایمانی و همچنین از نظر هموگلوبین و هماتوکربیت قبل و پس از عمل اختلاف معنی داری نداشتند ( $p > 0.05$ ).

**کلمات کلیدی:**

ترانسفوزیون، خونریزی حین عمل، زیر زبانی، سزارین، میزپرتوستول

**لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:**<https://civilica.com/doc/1728320>