

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر کرم فنی توئین بر بهبود زخم سزارین

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 17، شماره 103 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

آراسته بسطامی - مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

ندا داوری دهکردی - مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

سارا ضیاغیم - مربی گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: سزارین یکی از شایع ترین اعمال جراحی در طب زنان و مامایی می باشد. التیام ناکافی زخم و ایجاد گسیختگی در برش جراحی، از علل اصلی عوارض پس از زایمان های سزارین می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر کرم فنی توئین بر بهبود زخم سزارین انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال ۱۳۹۱ بر روی ۸۰ زن مراجعه کننده داوطلب عمل سزارین در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز انجام شد. مادران به صورت تصادفی به دو گروه مصرف کننده فنی توئین و دارونما (۴۰ نفر در هر گروه) تقسیم شدند. میزان بهبود برش سزارین در روزهای ۷ و ۱۴ بعد از ترمیم با استفاده از مقیاس ریدا ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های تی مستقل، کای دو و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین نمرات بهبود زخم در گروه فنی توئین در مقایسه با دارونما در روزهای هفتم و چهاردهم پس از عمل کمتر بود ($p=۰۰۱/۰$)، به این معنا که بهبود زخم در گروه مصرف کننده فنی توئین بهتر بود. همچنین دو گروه از نظر بهبودی کامل زخم در روز چهاردهم پس از عمل، اختلاف آماری معناداری داشتند ($p=۰۰۳/۰$). نتیجه گیری: کرم فنی توئین بر تسریع روند بهبود زخم سزارین موثر است.

کلمات کلیدی:

ترمیم زخم، سزارین، فنی توئین

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1728385>

