سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
روزه داری و پیامدهای بارداری

محل انتشار:
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران, دوره 16, شماره 57 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:
حسن بسکابادی - *دانشیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.*

صدیقه آیتی - *دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.*

مریم ذاکری حمیدی - *دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.*

طاهره محبی - *کارشناس ارشد پرستاری نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.*

خلاصه مقاله:
مقدمه: بررسی تاثیر روزه داری بر سلامت مادران باردار، ضرورتی انکارناپذیر است. مطالعات انجام شده در این زمینه، نتایج متناقصی را گزارش کرده اند، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای بارداری مادران روزه دار و غیر روزه دار انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ بر روی ۱۰۰۰ زن باردار در بخش مامایی بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. افراد بر اساس شرح حال به دو گروه مورد (مادرانی که حداقل ۱۰ روز در طول بارداری روزه گرفته بودند = ۶۱۴ نفر) و شاهد (مادرانی که روزه نگرفته بودند = ۳۸۶ نفر) تقسیم شدند. مادران دو گروه، بیماری خاصی در دوران بارداری نداشتند. سپس مشخصات افراد و پیامدهای بارداری دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۵/۱۱) و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، من ویتنی و کورسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰۵/۰ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: دو گروه مورد مطالعه از نظر سن مادر (p=۴۹۹/۰)، شغل (p=۳۸۴/۰)، تحصیلات (p=۲۴۵/۰)، پاریتی (p=۰۹۴/۰) و مراقبت قبل از تولد (p=۲۲۲/۰) همگن بودند. سزارین در ۱۹۴ نفر (۸/۵۰%) از گروه شاهد و در ۲۵۲ نفر (۸/۴۱%) از گروه مورد انجام شده بود (۰۰۸/۰=۴۶. p) نفر (۱۵%) از گروه شاهد و ۲۸ نفر (۲/۱۷%) از گروه مورد به عفونت حین زایمان مبتلا بودند (p=۲۱۲/۰). میانگین وزن نوزادان در گروه شاهد ۳۰۰۰ گرم و در گروه مورد ۳۱۷۰ گرم بود (p=۰۶۵/۰). میانگین وزن قبل از بارداری در مادران گروه مورد ۱۶/۶۰ و در گروه شاهد ۵۸/۵۸ کیلوگرم بود (p=۰۵۳/۰). میانگین وزن ماه آخر بارداری در مادران گروه مورد ۹۵/۷۰ و در گروه شاهد ۷۷/۷۰ کیلوگرم بود (p=۴۴۳/۰). نتیجه گیری: روزه داری بر روی پیامدهای بارداری (عفونت بارداری و حین زایمان، وزن قبل از بارداری و وزن ماه آخر بارداری، مراقبت های پره ناتال و تولد نوزاد نارس) تاثیر قابل توجهی ندارد.

کلمات کلیدی:
بارداری, روزه داری, زایمان, عفونت, نوزاد نارس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/1729231