

## عنوان مقاله:

گزارش یک مورد سندرم تحریک بیش از حد تخمدان پس از هیدروپیس ایمنون جنین

## محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 16، شماره 43 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

## نویسندگان:

سیمه کدخدایان - دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

ملیحه محمودی نیا - دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

## خلاصه مقاله:

مقدمه: سندرم تحریک بیش از حد تخمدان اغلب ایاتروژنیک و عارضه ای از درمان های ناباروری است. اما گاهی این سندرم می تواند به دنبال بارداری چندقلویی، بارداری مولار، کم کاری تیروئید و به ندرت به دنبال هیدروپیس جنین ایجاد شود. در این گزارش، یک مورد سندرم تحریک بیش از حد تخمدان توضیح داده می شود که به دنبال بارداری با جنین هیدروپیس ایجاد شد. معرفی بیمار: بیمار، خانم ۳۵ ساله ای با سابقه زایمان طبیعی و هیدروپیس جنین است که به علت ناسازگاری RH با شکایت درد شکم، تهوع و بی اشتها به بیمارستان مراجعه کرد و با تشخیص احتمالی سندرم تحریک بیش از حد تخمدان، بستری شد. بیمار در طی بستری دچار علائم بالینی و آزمایشگاهی سندرم تحریک بیش از حد تخمدان شد و پس از دو هفته اقدامات درمانی و حمایتی، با حال عمومی خوب ترخیص شد. نتیجه گیری: سندرم تحریک بیش از حد تخمدان به دنبال هیدروپیس جنین بسیار نادر است، اما در برخورد با این عارضه، باید سایر علل درد و بزرگی شکم در نظر گرفته شود.

## کلمات کلیدی:

آسیت، اولیگوری، سندرم تحریک بیش از حد تخمدان، هیدروپیس جنین، هیدروتوراکس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1729273>

