

عنوان مقاله:

بررسی ارتباط وزن نوزاد با شیوع و شدت پرولاپس ارگان های لگن

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 15، شماره 16 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسنده:

اشرف دیرکوند مقدم - کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: پرولاپس ارگان های لگن یکی از اختلالات شایع زنان است که بیش از نیمی از زنان زایمان کرده در مراحل از زندگی، این اختلال را تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط وزن نوزاد با شیوع و شدت پرولاپس ارگان های لگن انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۸۴ بر روی ۳۶۵ نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام انجام شد. افراد با روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه، فرم ثبت معاینات و با روش مصاحبه و مشاهده انجام شد. معاینه واژینال بر اساس سیستم POPQ انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۴) و آزمون کای دو انجام و از تست های آمار توصیفی جهت بررسی فراوانی و میانگین ها استفاده شد. میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: از ۳۶۵ زن مورد مطالعه، ۲/۱۹ درصد بدون پرولاپس و ۸/۸۰ درصد دارای درجات متفاوتی از پرولاپس بودند. شایع ترین نوع پرولاپس شامل پرولاپس درجه دو (۸/۵۶٪) و دیواره قدامی (۳/۷۲٪) بود. بر اساس آزمون آماری من ویتنی، بین وزن نوزادان و پرولاپس ارتباط آماری معنی داری وجود داشت ($p=11/0$). نتیجه گیری: پرولاپس ارگان های لگن شایع و با وزن نوزادان متولد شده ارتباط داشت.

کلمات کلیدی:

پرولاپس ارگان های لگن، سیستم POP-Q، ماکروزومی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1729379>

