

**عنوان مقاله:**

بررسی فراوانی عفونت مایکوپلاسمای اوره آپلاسمای زنان بازدار با بازداری زودرس مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال ۱۳۸۷

**محل انتشار:**

مجله زنان، مامایی و نازلی ایران، دوره ۱۵، شماره ۱۰ (سال: ۱۳۹۱)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۶

**نویسنده‌گان:**

زهرا شهشهان - دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

نوشین حسینی - دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

**خلاصه مقاله:**

مقدمه: مایکوپلاسمای اوره آپلاسمای زنان تثخیص داده می‌شوند هر چند این عفونت مایکوپلاسمای اوره آپلاسمای زنان با زایمان زودرس انجام شد. روشکار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۸۷ بر روی ۱۳۰ زن بازدار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اصفهان انجام شد. ۶۵ نفر از کسانی که با شکایت زایمان زودرس مراجعه کرده بودند در گروه مورد و ۶۴ نفر از کسانی که زایمان ترم داشتند در گروه کنترل قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی علاوه بر مشخصات فردی و پیامدهای بازداری شامل فراوانی مایکوپلاسمای اوره آپلاسمای اوره آپلاسمای زنان بازدار مراجعت کننده بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقادیر  $p$  کمتر از  $<0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: ۳۶ نفر در گروه مورد به دلیل زایمان ترم پس از انجام مراقبت‌های درمانی از مطالعه خارج شدند و ۲۹ نفر در آالیز نهایی وارد شدند. در گروه کنترل تمامی افراد در آالیز نهایی وارد شدند. ۱۱ نفر ( $37.9\%$ ) از زنان با زایمان زودرس، عفونت مایکوپلاسمای داشتند که به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل ( $16.9\%$ ) بود ( $p=0.0003$ ). اوره آپلاسمای زنان گروه مورد وجود داشت که نسبت به گروه کنترل ( $43\%$ ) تفاوت معنی داری داشت. (p=0.01). نتیجه‌گیری: بین ابتلاء به عفونت مایکوپلاسمای اوره آپلاسمای و خطر زایمان زودرس ارتباط معنی داری وجود دارد و فراوانی عفونت مایکوپلاسمای اوره آپلاسمای زنان بازدار مراجعت کننده بودند.

**کلمات کلیدی:**

اوره آپلاسمای بازداری، زایمان زودرس، مایکوپلاسمای

**لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:**

<https://civilica.com/doc/1729404>

