

عنوان مقاله:

بررسی میزان و علل مشارکت یا عدم مشارکت زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان در برنامه های غربالگری سرطان های دهانه رحم و پستان

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 13، شماره 3 (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

ژیلا سلطان احمدی - مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

عباس عباس زاده - مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

بتول تیرگری - مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: سرطان های پستان و دهانه ی رحم شیوع و مرگ و میر بالایی در بین زنان دارند. روش های غربالگری، بهترین روش های تشخیصی زودرس سرطان های زنان هستند که انجام آن ها به طور چشم گیری از میزان مرگ و میر آنان می کاهد. لذا این مطالعه به منظور تعیین میزان و علل مشارکت و عدم مشارکت زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر کرمان در برنامه های غربالگری سرطان های پستان و دهانه ی رحم در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. روش کار: این پژوهش، مطالعه ای توصیفی است که بر روی ۲۰۰ زن متاهل که جهت کنترل بارداری، مراقبت بعد از زایمان، مشاوره ی تنظیم خانواده، بیماری های زنان ویا واکسیناسیون کودکانشان به پنج درمانگاه شهر کرمان مراجعه کرده بودند، انجام شد. روش نمونه گیری، خوشه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه بود که پس از تعیین روایی و پایایی (ضریب پایایی ۰/۹۲) توسط مصاحبه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS (نسخه ۱۴) و آزمون های آماری مجذور کای و ANOVA انجام شد. یافته ها: ۵/۲۲٪ زنان مورد مطالعه، در برنامه خودآزمایی پستان، ۵/۲۱٪ در معاینه بالینی پستان و ۲۷٪ در پاپ اسمیر مشارکت داشتند. بیش ترین علل مشارکت در برنامه های غربالگری سرطان پستان آگاهی از اهمیت آن و در برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم: تشخیص زود هنگام سرطان بود. هم چنین بیش ترین علت عدم مشارکت زنان (در برنامه های غربالگری سرطان های پستان و سرویکس) عدم توصیه پزشک بود. مشارکت زنان در برنامه خود آزمایی پستان با سطح تحصیلات و شغل ($p < 0/001$)، معاینه ی بالینی پستان با سطح تحصیلات و شغل ($p < 0/001$) و وضعیت اقتصادی ($p = 0/04$) وجود داشت. هم چنین بین انجام نیز پاپ اسمیر با شغل ($p < 0/001$)، سن ($p = 0/14$) و سطح تحصیلات ($p = 0/16$) نیز رابطه ی آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: مشارکت زنان مورد مطالعه در برنامه های غربالگری چندان مطلوب نمی باشد. بیش ترین علل عدم مشارکت، عدم توصیه پزشک و عدم آگاهی بود، لذا تدوین برنامه های آموزشی توسط مراکز بهداشتی جهت آشنایی زنان با این برنامه ها، و نیز توصیه پزشکان، ماماها و کارکنان بهداشتی به شرکت آنان در این برنامه ها ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:

سرطان دهانه رحم، سرطان پستان، غربالگری، میزان مشارکت، پاپ اسمیر، خودآزمایی پستان، معاینه ی بالینی پستان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1729539>

