

عنوان مقاله:

نقش سطوح LVEF در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به CAD: نقش میانجی ادراکات بیماری و عواطف مثبت/منفی

محل انتشار:

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، دوره 10، شماره 39 (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 25

نویسندگان:

رسول حشمتی - دانشگاه تبریز

جواد حاتمی - دانشگاه تهران

هادی بهرامی احسان - دانشگاه تهران

سعید صادقیان - دانشگاه علوم پزشکی تهران

خلاصه مقاله:

هدف پژوهش حاضر تبیین نقش LVEF، ادراکات بیماری و عواطف مثبت و منفی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQOL) بیماران CAD و طراحی یک مدل مفروض بر اساس این متغیرها بود. در یک بررسی توصیفی-همبستگی، ۲۷۰ بیمار مبتلا به CAD از بیمارستان مرکز قلب تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از فرم کوتاه پرسشنامه ادراک بیماری (Brief IPQ)، فرم کوتاه مقیاس بین المللی عاطفه مثبت منفی (I-PANAS-SF) و پرسشنامه آنژین سیاتل (SAQ) استفاده شد. همچنین، دستگاه اکوکاردیوگرافی برای به‌دست آوردن LVEF مورد استفاده قرار گرفت. شاخص‌های برازندگی و نتایج معادلات ساختاری از مدل مفروض در خصوص اثرات LVEF، ادراکات بیماری و عواطف مثبت و منفی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران CAD حمایت کرد و نشان داد که این مدل از برازش مطلوب برخوردار است. اثر مستقیم LVEF بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نیرومندتر از اثر غیرمستقیم آن از طریق ادراک بیماری است. همچنین اثر مستقیم و غیرمستقیم آن از طریق عواطف مثبت و منفی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت معنی‌دار نیست. این یافته‌ها نقش اساسی LVEF، ادراکات بیماری و عواطف مثبت و منفی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران CAD را نشان داد. بنابراین، لازم است مداخلاتی جهت افزایش سطوح LVEF و مداخلات متمرکز بر ادراکات بیماری و عواطف مثبت برای این بیماران تدارک دیده شود.

کلمات کلیدی:

LVEF، ادراکات بیماری، عواطف مثبت و منفی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1732151>

