

عنوان مقاله:

ارتباط شدت یبوست با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در استان چهارمحال و بختیاری: یک مطالعه مقطعی

محل انتشار:

نشریه پرستاری مراقبت ویژه، دوره 15، شماره 4 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

صادق شیروانی فارسانی - Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid University, Tehran, Iran

محمد رضا حیدری - Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid University, Tehran, Iran

محسن ناصری - Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Shahid University, Tehran, Iran

پریسا جوادیان - Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

سعید مردانی - Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

هدی شیرافکن - Department of Biostatistics, Faculty of Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: بیماران تحت همودیالیز دارای مشکلات مختلف گوارشی مانند یبوست هستند که بر کیفیت زندگی آنان تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شدت یبوست با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. روش ها: این پژوهش مقطعی بر روی ۲۰۰ بیمار تحت همودیالیز به صورت سرشماری در چهار بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۱۴۰۰ انجام شد. ابزار پژوهش شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و بالینی و متغیرهای آزمایشگاهی، پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی بیمار دارای یبوست و مقیاس سنجش یبوست بود. یافته ها: میانگین کل کیفیت زندگی بیماران $31/213 \pm 38/93$ بود. ارتباط زیرمقیاس های چهارگانه کیفیت زندگی با شدت یبوست نشان داد که بین کیفیت زندگی و زیرمقیاس های آن با شدت یبوست همبستگی معنی دار آماری وجود دارد ($p < 0/001$). بین کیفیت زندگی با متغیر تحصیلات و وضعیت اشتغال ارتباط معنی دار آماری وجود داشت ($p < 0/001$). همچنین بین خرده مقیاس دغدغه و نگرانی با وزن ($p = 0/028$) و بین خرده مقیاس رضایتمندی با هماتوکریت ($p = 0/043$) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، بین کیفیت زندگی و شدت یبوست و متغیرهای تحصیلات و وضعیت اشتغال ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین بین خرده مقیاس دغدغه و نگرانی با وزن و بین خرده مقیاس رضایتمندی با هماتوکریت ارتباط معنی دار دیده شد.

کلمات کلیدی:

Quality of Life, Haemodialysis, Constipation, کیفیت زندگی، همودیالیز، یبوست

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1732280>

